



Airone® Più e Domark® 125: agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Usare con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



COMPOSIZIONE

Rame metallo 28%
(da ossicloruro tetraramico 14%
e da idrossido 14%)

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

INDICAZIONI DI RISCHIO

(Xi) Irritante;
(N) Pericoloso per l'ambiente

DOSE SU BARBABIETOLA

3,5-4 kg/ha

TEMPO DI CARENZA

Barbabetola da zucchero 20 gg.

REG. MIN. DELLA SALUTE

n° 12737 del 31.07.2009

CONFEZIONI

1 - 10 kg.

Airone® Più: marchio registrato e
prodotto originale Isagro Spa.



COMPOSIZIONE

Tetraconazolo (125 g/l) 11,6%

FORMULAZIONE

Emulsione olio/acqua

INDICAZIONI DI RISCHIO

(nc) Non classificato

DOSE SU BARBABIETOLA

0,8 L/ha

TEMPO DI CARENZA

Barbabetola da zucchero 21 gg.

REG. MIN. DELLA SALUTE

n° 13065 del 12.10.2009

CONFEZIONI

0,250 - 1 L

Domark® 125: marchio registrato
e prodotto originale Isagro Spa.



Gowan Italia S.p.A.

Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 629911 - Fax 0546 623943

E-mail: gowanitalia@gowanitalia.it - www.gowanitalia.it


Domark® 125 & Airone® Più WG

**Le soluzioni
vincenti a difesa
del tuo reddito!**



AIRONE PIÙ e DOMARK 125: LE SCELTE VINCENTI

- Efficacia elevata nel controllo di Cercospora e Oidio
- Strategia antiresistenza
- Salvaguardia della resa produttiva e del grado zuccherino
- Assenza di effetti indesiderati sui parametri qualitativi
- Compatibili con i programmi di difesa integrata e consigliati dai servizi tecnici del settore



STRATEGIE D'IMPIEGO

La difesa della Barbabietola dalla Cercospora prevede l'impiego di **fungicidi a differente meccanismo d'azione** (strategia anti-resistenza) a partire da fine giugno – inizio luglio (a seconda delle indicazioni dei servizi tecnici di riferimento, sulla base delle condizioni pedo-climatiche, della suscettibilità varietale e della pressione di malattia), ad intervalli di 15-20 giorni e fino a circa un mese prima della raccolta (rispettando i tempi di carenza).




CERCOSPORA: LA MALATTIA

La **Cercosporiosi** è l'avversità più pericolosa della Barbabietola, diffusa in tutte le zone di coltivazione, con particolare gravità nei climi caldo-umidi. Causata dal fungo deuteromicete *Cercospora beticola*, può colpire tutte le parti verdi della pianta, ma anche piccioli, scapi e organi fiorali. Si manifesta inizialmente con **areole puntiformi isolate**, con decolorazione e successivo imbrunimento dei tessuti, che poi si espandono progressivamente evolvendo in macchie rotondeggianti di 2-3 mm di diametro, circondate dal caratteristico alone bruno-rossastro.

Queste lesioni possono confluire tra loro dando origine ad ampie aree colpite, **fino al completo disseccamento delle foglie**. In questo modo si riduce la superficie fotosintetica con diminuzione, quindi, dell'attività metabolica di produzione degli zuccheri. Inoltre, si induce nella pianta un ciclico ricaccio fogliare che provoca il caratteristico allungamento del colletto e **depaupera ulteriormente le riserve zuccherine e la qualità generale delle radici**.

PROVA DI EFFICACIA

Viene riportato un esempio di prova di efficacia in cui **Airone Più** viene messo a confronto con i principali standard di riferimento e **garantisce ottimi risultati** nel contenimento degli attacchi di Cercospora.



Servizio tecnico: Beta
Anno: 2012
Località: Passo Segni (BO)
Varietà: Massima
3 trattamenti ripetuti: 15/6, 5/7, 25/7
Rilievo: 8 agosto
Testimone: 56,2 % AFA (Area Fogliare Ammalata)



PROVE DI STRATEGIA

Airone Più e Domark 125 si possono inserire in strategie di vario tipo, in cui possono esprimere la loro efficacia nei confronti della Cercospora, con un **vantaggio evidente in termini di produttività culturale**. I grafici riportano i risultati della sperimentazione condotta nel 2013 in Emilia e Veneto ad opera del Servizio Tecnico "Beta".

Passo Segni (BO)	Località	Poggio Rusco (MN)
Fabrizia (CERCOBE - MS)	Varietà	Massima (CERCOBE - NT)
04/03/2013	Semina	17/04/2013
02/07	Applicazioni	03/07
22/07	preventive*	24/07
09/08	(epoca A-B-C)	07/08
03/09	Rilievo	03/09
96,4%	Testimone (area fogliare ammalata)	92,06%

* Prima applicazione alla comparsa delle prime macchie, seguita da successive applicazioni ad intervalli di 18-20 giorni.

