

KERBON

KERB™ FLO + BONALAN™

Abbinamento in un'unica confezione (Twin Pack) di due prodotti erbicidi (Kerb Flo e Bonalan) utilizzati per il diserbo delle Insalate

CARATTERISTICHE:

È l'abbinamento in un'unica confezione (Twin Pack) studiata da Dow Agrosciences, di due formulati erbicidi usati in pre-emergenza delle Insalate. Propizamide (p.a. del Kerb Flo) è un erbicida appartenente alla famiglia chimica delle benzamidi, viene assorbito quasi esclusivamente per via radicale; agisce inibendo la moltiplicazione e lo sviluppo dei meristemi. Benfluralin (p.a. del Bonalan) è invece un erbicida appartenente alla famiglia chimica delle dinitroaniline, agisce impedendo la normale divisione cellulare e inibisce la formazione delle radici.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

Kerbbon può essere impiegato in pre-semina o pre-trapianto delle insalate interrando il prodotto subito dopo la sua applicazione con una lavorazione superficiale o con un'irrigazione. L'abbinamento dei due erbicidi permette di ampliare lo spettro di azione degli stessi garantendo un'ottima efficacia.

AVVERTENZE:

Nel caso di rotazione con altre colture dopo l'uso del Kerbon vanno rispettati i seguenti intervalli di tempo:
Mais, Sorgo, Patata e Crucifere: 2 mesi;
Peperone, Patata, Pomodoro, Aglio, Cipolla, Menta, Spinacio, Lino, Melanzana e Barbabietola da zucchero: 4 mesi;
Avena, Frumento, Orzo, Segale e Graminacee foraggiere: 6 mesi.
Prima della semina di tali colture effettuare una lavorazione profonda.

INFESTANTI CONTROLLATE:

Kerb Flo è attivo nei confronti di monocotiledoni e dicotiledoni. Sensibili: *Avena* spp., *Alopecurus myosuroides*, *Lolium* spp., *Setaria* spp., *Poa* spp., *Digitaria sanguinalis*, *Phalaris* spp., *Agropyron repens*, *Sorghum halepense* (da seme), *Cuscuta* spp., *Stellaria media*, *Polygonum aviculare*, *Solanum nigrum*, *Chenopodium album*, *Urtica* spp., *Papaver rhoeas*, *Fumaria officinalis*, *Polygonum persicaria*, *Raphanus* spp., *Palantago lanceolata*, *Portulaca oleracea*, *Rumex* spp. (da seme), *Veronica* spp. e *Viola tricolor*.
Mediamente sensibili: *Amaranthus retroflexus* (in fine inverno inizio primavera), *Matricaria chamomilla*, *Capsella bursa-pastoris* e *Polygonum lapathifolium*.
Bonalan è attivo nei confronti di monocotiledoni e dicotiledoni quali: *Digitaria* spp., *Echinochloa crusgalli*, *Setaria* spp., *Sorghum halepense*, *Panicum* spp., *Poa annua*, *Lolium* spp., *Amarantus* spp., *Chenopodium album*, *Mollugo verticillata*, *Polygonum aviculare*, *Portulaca oleracea* e *Stellaria media* (le graminacee perenni indicate solo da seme).

COMPOSIZIONE:

Kerb Flo: Propizamide pura 400 g
Coformulanti q.b. a 100 g
Bonalan: Benfluralin puro 18,2 g
Coformulanti q.b. a 100 g

CLASSIFICAZIONE:

Kerb Flo:



Attenzione
H351, H412, EUH401

Bonalan:



Pericolo
H226, H304, H315, H317, H318, H332, H335, H373, H410, EUH401

FORMULAZIONE:


Kerb Flo: Sospensione liquida
Bonalan: Liquido emulsionabile

CONFEZIONE:

Tanica con 2 serbatoi separati (twin pack) contenenti: Kerb Flo 1,5 litri, Bonalan 3 litri

IMBALLO:

4 confezioni da 4,5 litri



Colture	Dosi	N° max di trattamenti annui	Int. sic. gg.
Lattughe, Scarole, Indivie, Cicorie, Radicchi	Kerb Flo: 3,5-4,5 l/ha Bonalan: 6,5-9,5 l/ha	1 -	-

Kerb Flo - Registrazione: N° 7930 del 13/07/1990
Bonalan - Registrazione: N° 2353 del 23/10/1976