

SELECT®



Erbicida graminicida selettivo per barbabietola da zucchero e da foraggio, pomodoro e soia

Caratteristiche: Prodotto graminicida di post emergenza efficace sulle principali infestanti graminacee.

Composizione: Clethodim puro 25 g (240 g/l)

Miscibilità: Si consiglia di utilizzare il prodotto da solo.

Registrazione: N° 8796 del 06-03-1996

Formulazione: EC - Emulsione concentrata

Indicazioni di pericolo CLP PERICOLO Frase H H304, H317, H319, H336, H411, EUH066, EUH208, EUH401		Confezioni 1 L
Gruppo HRAC A	Marchio registrato Arysta Lifesciences S.A.S.	Titolare registrazione Arysta Lifesciences S.A.S.
Gruppo imballaggio III	Trasporto ONU 3082	Classificazione ADR 9

Culture (intervallo di sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Pomodoro (30 giorni)	Sorgo volgare o sorghetta (<i>Sorghum halepense</i>) sia da rizoma sia da seme, Giavone (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Setaria (<i>Setaria</i> sp.), Avena selvatica (<i>Avena</i> sp.), Sanguinella (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Loglio (<i>Lolium</i> sp.), Coda di volpe (<i>Alopecurus myosuroides</i>), Scagliola o falaride (<i>Phalaris</i> sp.), Giavone americano (<i>Panicum dichotomiflorum</i>), Fienarola (<i>Poa</i> sp.), ricacci di frumento (<i>Triticum</i> sp.) ed orzo (<i>Hordeum</i> sp.)	0,6 l/ha (0,6 + 0,6 su infestanti perenni)	Post emergenza delle erbe infestanti dallo stadio di tre foglie all'inizio dell'accostamento. Contro il <i>Sorghum halepense</i> da rizoma è consigliabile un doppio intervento (0,6 + 0,6); il primo quando è alto 20-30 cm ed il secondo dopo circa 15 giorni.
Soia, Barbabietola da zucchero e da foraggio (60 giorni)	Sorgo volgare o sorghetta (<i>Sorghum halepense</i>) sia da rizoma sia da seme, Giavone (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Setaria (<i>Setaria</i> sp.), Avena selvatica (<i>Avena</i> sp.), Sanguinella (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Loglio (<i>Lolium</i> sp.), Coda di volpe (<i>Alopecurus myosuroides</i>), Scagliola o falaride (<i>Phalaris</i> sp.), Giavone americano (<i>Panicum dichotomiflorum</i>), Fienarola (<i>Poa</i> sp.), ricacci di frumento (<i>Triticum</i> sp.) ed orzo (<i>Hordeum</i> sp.)	0,6 l/ha (0,6 + 0,6 su infestanti perenni)	Post emergenza delle erbe infestanti dallo stadio di tre foglie all'inizio dell'accostamento. Contro il <i>Sorghum halepense</i> da rizoma è consigliabile un doppio intervento (0,6 + 0,6); il primo quando è alto 20-30 cm ed il secondo dopo circa 15 giorni.

Indicazioni per il corretto impiego - Select svolge una maggior efficacia con l'aggiunta di un bagnante. Non usare Select in previsione di un'imminente pioggia.