

Dacol L40

**RICHIESTO
PATENTINO**



Insetticida sistemico liquido

Caratteristiche: Insetticida con sistemica locale con azione di contatto ed ingestione.

Composizione: Dimetoato puro 38 g (406 g/l)

Miscibilità: Miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli aventi reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese basica).

Registrazione: N° 3468 del 14-01-1980

Formulazione: SL - Liquido (concentrato) solubile in acqua

Indicazioni di pericolo CLP PERICOLO Frasei H H226, H304, H302 + H332, H411, EUH401		Confezioni 1 L
Gruppo IRAC 1B	Marchio registrato Cheminova A/S	Titolare registrazione Cheminova A/S
Gruppo imballaggio III	Trasporto ONU 1993	Classificazione ADR 3

Colture (intervallo di sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Olivo (28 giorni)	Mosca delle olive (<i>Dacus oleae</i>), Tignola (<i>Prays oleae</i>), Liotripide	80-150 ml/hl	
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino, bergamotto, cedro, pompelmo, pomelo, tangerino, limetta, chinotto, kumquat, arancio amaro) (piante non in produzione)	Afidi (<i>Aphis citricola</i> , <i>Toxoptera aurantii</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	80-150 ml/hl	Effettuare al massimo due applicazioni per stagione. Non trattare i cedri ed i limoni della varietà Interdonato.
	Cocciniglie	80-150 ml/hl	
Frumento (28 giorni)	Afidi (<i>Sitobion avenae</i> , <i>S. fragariae</i> , <i>Metopolopium dirhodum</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>R. maydis</i> , <i>Schizaphis graminarum</i>), Sminturide	80-150 ml/hl	Utilizzare un volume massimo di acqua di 660 l/ha.
Asparago (14 giorni)	Mosca (<i>Platyparea poeciloptera</i>), Aleurodidi, Afidi	80-150 ml/hl	
Bietola rossa (30 giorni)	Mosca, Afidi, Sminturide	80-150 ml/hl	
Pomodoro, in pieno campo (21 giorni)	Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>), Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>), Nottue	80-150 ml/hl	
Floreali, Ornamentali, in pieno campo e serra	Afidi (<i>Macrosiphum</i> sp., <i>Myzus</i> sp., etc.), Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Heliothrips</i> sp., etc.)	80-150 ml/hl	Non usare su Crisantemo.
Pioppo	Afide lanigero (<i>Phloeomyzus passerinii</i>), Tingide (<i>Monosteira unicostata</i>)	80-150 ml/hl	

Indicazioni per il corretto impiego - Il prodotto è tossico per gli insetti utili e la fauna in generale. Il prodotto non deve essere applicato con le attrezzature a basso volume su ulivi delle cultivar Coratina, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, inoltre su limone Interdonato, cedro, crisantemo.