Armetil Flow

RICHIESTO PATENTINO

Indicazioni di pericolo CLP		Confezioni
 PERICOLO **Frasi H** H302, H318, H332, H410, EUH208, EUH401		1 L - 5 L 
Gruppo FRAC 4 / M1	**Marchio registrato** IQV Italia Srl	**Titolare registrazione** IQV Italia Srl
Gruppo imballaggio III	**Trasporto ONU** 3082	**Classificazione ADR** 9

Fungicida sistemico e di contatto in sospensione concentrata

Caratteristiche: Armetil Flow è un fungicida sistemico e di contatto ad azione sia preventiva che curativa.

Composizione: **Metalaxil** 49 g/l - **Rame da idrossido** 259 g/l

Miscibilità: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Registrazione: N° 15300 del 23-01-2012

Formulazione: SC - Sospensione concentrata

Colture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Vite (28 giorni)	Peronospora	400 ml/hl (2,4-4 l/ha)	Effettuare 2-4 trattamenti ogni 14 giorni dall'epoca di pre-fioritura.
Melo	Fitoftora	100-150 ml/pianta	**Non effettuare trattamenti estivi.** Impiegare con l'aggiunta di un bagnante alla dose di 200 ml/ha. Bagnare bene la zona del colletto ed il terreno sottostante oppure distribuire con fertirrigazione. In caso di forti attacchi effettuare spennellature al tronco con soluzione al 20%.
Soia (150 giorni)	Peronospora, Fitoftora	4 l/ha	Effettuare 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni.
Pomodoro (14 giorni)	Peronospora	400 ml/hl (2 l/ha)	Effettuare 4 trattamenti ogni 14 giorni.
Fragola (40 giorni)	Fitoftora	3-4 l/ha	Effettuare 2 trattamenti 15-20 giorni dopo l'impianto e 30 giorni dopo. Eventualmente immergere le piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3%.
Lattuga (15 giorni)	Peronospora, Alternaria, Bremia	3-4 l/ha	Effettuare 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni.
Cavolo verza (60 giorni)	Peronospora, Alternaria, Bremia	3-4 l/ha	Effettuare 2-3 trattamenti ogni 10-14 giorni.

Indicazioni per il corretto impiego - Non trattare durante la fioritura. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.