Admiral® echo

Indicazioni di pericolo CLP		Confezioni
 ATTENZIONE **Frasi H** H371, H373, H411, EUH401		0,25 L - 1 L 
Gruppo IRAC 7C	**Marchio registrato** Sumitomo Chemical Company Tokyo	**Titolare registrazione** Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Gruppo imballaggio III	**Trasporto ONU** 3082	**Classificazione ADR** 9

Insetticida specifico per il controllo di cocciniglie su pomacee, drupacee ed agrumi e di mosca bianca su colture coltivate in serra (pomodori, melanzane, peperoni, cetrioli, cetriolini, zucchine)

Caratteristiche: Admiral echo è un insetticida specifico con una lunga durata d'azione nei confronti di cocciniglie: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi *(Aonidiella aurantii)*, Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes* sp.), Parlatoria (*Parlatoria* sp.), Cocciniglia bianca degli agrumi *(Aspidiotus neri)*, Cocciniglia mezzo grano di pepe *(Saissetia oleae)*; su Cocciniglia di San Josè *(Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus)* delle pomacee e sulla Cocciniglia bianca del pesco *(Pseudaulacaspis pentagona)* delle drupacee e sulle mosche bianche *(Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)* delle colture coltivate in serra di pomodoro, melanzana, peperone e cucurbitacee con buccia commestibile.

Composizione: **Pyriproxyfen** 9,81 g (=100 g/l)

Miscibilità: Il prodotto si impiega da solo.

Registrazione: N° 15053 del 05-12-2011

Formulazione: EW - Emulsione olio/acqua

Colture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Agrumi (28 giorni)	Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes* sp.), Cocciniglia mezzo grano di pepe *(Saissetia oleae)*	40-50 ml/hl	Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha. Contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione.
	Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi *(Aonidiella aurantii)*, Parlatoria (*Parlatoria* sp.), Cocciniglia bianca degli agrumi *(Aspidiotus neri)*	50-75 ml/hl	Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha. Contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. In presenza di *Parlatoria* sp. trattare quando le prime larve sono visibili.
Pomacee, drupacee (pesco, nettarina, albicocco) (trattamenti pre-fiorali)	Cocciniglia di San Josè *(Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus)*, Cocciniglia bianca del pesco *(Pseudaulacaspis pentagona)*	35-40 ml/hl	Impiegare un volume d'acqua di 600-800 l/ha. Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di San Josè e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco allo stadio di femmina fecondata. Su pomacee e drupacee trattare prima della fioritura.
Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, cetriolino, zucchino coltivati in serra (3 giorni)	Mosche bianche *(Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*	50-75 ml/hl	Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha. Applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.

Indicazioni per il corretto impiego - Utilizzare ad una distanza dai corpi idrici superficiali non inferiore a 20 metri con ugelli antideriva (50% di riduzione) su agrumi, pomacee e drupacee. Mantenere una fascia di rispetto non trattata di 150 metri da piante di gelso destinate all'alimentazione del baco da seta.