



Registrazione: N° 12865 del 28-09-2006
Composizione: Clothianidin puro 50%
Formulazione: WG - Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)
Miscibilità: Incompatibile con i formulati a reazione alcalina.
Confezioni: 0,2 kg
Gruppo IRAC: 4A

Classificazione

CLP - Indicazioni di pericolo

Pittogrammi:



Avvertenza: ATTENZIONE

Frase H: H302 – Nocivo se ingerito. H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

DPD - Indicazioni di pericolo

Pittogrammi:



Xn – Nocivo
N – Pericoloso per l'ambiente

Frase R:

R22 Nocivo per ingestione. R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

® Marchio registrato Sumitomo Chemical Company Tokyo

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.).

www.siapa.mi.it

Siapa

Alle radici del futuro

Per il controllo dei parassiti della patata



Siapa

MODALITÀ D'AZIONE

Dantop® 50 WG è un **insetticida neonicotinoide** ideale per il controllo di **afidi e dorifora** (*Leptinotarsa decemlineata*) della patata.

Ha elevata sistemica e translaminarità che gli consentono una distribuzione ottimale all'interno dei tessuti vegetali.



DOSI DI IMPIEGO

Dantop® 50 WG si utilizza alla prima comparsa dell'infestazione con un dosaggio di **40-60 g/ha**. Tempo di carenza 7 giorni.

Se c'è necessità ripetere l'intervento dopo 15 giorni dal primo intervento.

Effettuare al massimo 2 trattamenti all'anno.

