



Avvertenza: **ATTENZIONE**
 Indicazioni di pericolo:
H410 - EUH208 - EUH401

FORMULAZIONE:

Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE:

Oxifluorfen puro 42,9% (500 g/l)

N. REGISTRAZIONE:

11223 del 04-03-2002

Caratteristiche

È un erbicida selettivo adatto per applicazioni di pre e post-emergenza che agisce per contatto sulla vegetazione presente al momento del trattamento ma anche sulle plantule che nascono successivamente.

Consigli per l'uso

Per applicazioni in pre-emergenza operare su terreno ben sminuzzato e livellato, privo di zolle, in assenza di infestanti o all'inizio della loro germinazione. Non utilizzare su Vite nel periodo compreso tra 20 giorni prima della ripresa vegetativa e l'allegagione. Su frutteti e agrumeti sospendere i trattamenti 20 giorni prima del risveglio vegetativo. Su Girasole, in impieghi di pre-emergenza, forti piogge possono determinare effetti fitotossici sulla coltura che scompaiono in breve tempo. Il prodotto deve essere impiegato solo con applicazioni in bande lungo la fila nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e prima decade di maggio.

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Pomacee, Drupacee, Arancio, Limone, Pompelmo, Vite, Nocciolo, Olivo	1 - 1,35 l/ha	Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto fare riferimento all'etichetta ministeriale	7 giorni per Olivo
Girasole	0,5 l/ha	Il prodotto può essere impiegato fino ai primi di maggio su culture seminate a file di 70-75 cm con applicazioni in bande di 25-30 cm	-
Carciofo	0,5 - 0,75 l/ha	In pre-emergenza	-
	0,75 - 1 l/ha	In post-emergenza (trattare con schermatura)	
Vivai di forestali ed Ornamentali	1 - 1,75 l/ha	Trattare in pre-emergenza delle infestanti. Su specie resinose, il prodotto può essere distribuito sulla vegetazione ma prima dell'emissione dei nuovi germogli. Si consiglia l'uso di attrezzature schermate	-
Bordi stradali, argini, sedi ferroviarie	2 - 2,5 l/ha	In pre-emergenza delle infestanti	-
	0,5 - 1,5 l/ha	In post-emergenza delle infestanti in miscela con TAIFUN MK CL	



Efficacia d'uso

Infestanti sensibili

Infestanti
mediamente sensibili

SPECIE INFESTANTI CONTROLLATE	SPETTRO D'AZIONE
Acetosella (<i>Oxalis Spp.</i>)	
Amaranto (<i>Amaranthus spp.</i>)	
Anagallide (<i>Anagallis arvensis</i>)	
Erba porcellana (<i>Portulaca oleracea</i>)	
Falso panico (<i>Setaria spp.</i>)	
Loglio (<i>Lolium spp.</i>)	
Malva (<i>Malva spp.</i>)	
Papavero comune (<i>Papaver rhoeas</i>)	
Poligonacee (<i>Polygonum spp.</i>)	
Sanguinella (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	
Senape selvatica (<i>Sinapis arvensis</i>)	

