

Electis® ZR



Fungicida per il controllo della peronospora della vite e del pomodoro

Electis® ZR è un antiperonosporico contenente due sostanze attive in miscela sinergica: *Zoxamide* e rame, fungicida di copertura multisito ad attività preventiva. *Zoxamide* è dotata di elevata affinità con le cere cuticolari che rivestono le foglie, i grappoli e le bacche, che garantisce una notevole resistenza al dilavamento; grazie all'inedito meccanismo di azione antimittotico non presenta resistenza incrociata con i principali fungicidi antiperonosporici. *Zoxamide* possiede inoltre un'eccellente attività collaterale antibotritica, molto utile nell'impiego su vite.

Vantaggi

Meccanismo di azione multisito. Ottima protezione del grappolo e delle bacche per la forte affinità con le cere cuticolari. Elevata resistenza al dilavamento. Favorevole profilo tossicologico e residuale. Nessuna interferenza sulla fermentazione del mosto. Breve periodo di carenza su pomodoro. **Eccellente azione collaterale su Botrite (Muffa grigia).**

Avvertenze

Evitare i trattamenti durante la fioritura.

Su vite non effettuare più di quattro applicazioni per anno e su Pomodoro non più di cinque applicazioni per anno.

Su entrambe le colture non effettuare comunque più di tre trattamenti consecutivi con prodotti contenenti Zoxamide.

È consigliabile alternare Electis® ZR con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Note	N° max tratt./anno	Periodo carenza
Vite	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	280 - 350	min. 2,8	Intervenire preventivamente ad intervalli di 8 - 10 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale. Utilizzare l'intervallo più breve e la dose maggiore nelle condizioni ambientali più favorevoli alla malattia.	4 (max 3 consecutivi)	28 gg.
Pomodoro	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	280 - 350	min. 2,8	Dosi in funzione della pressione della malattia. Iniziare le irrorazioni in modo preventivo quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Si consiglia un intervallo di 7 giorni con la dose maggiore in situazione di maggiore pressione epidemica.	5 (max 3 consecutivi)	3 gg.



Composizione

Zoxamide	4,3%
Rame metallo (da ossicloruro)	28,6%

Formulazione

Polvere Bagnabile

Confezioni

1 - 10 kg

Registrazione

n° 14803 del 15.10.2009



Electis® ZR:
marchio registrato
e prodotto originale Gowan.