GRISU®

Composizione	Iprodione 40,96% (500 g/L)
Formulazione	Sospensione concentrata
Gruppo	FRAC 2
N. registrazione	14931 del 15-05-2012
Confezione	1 L (x 10)

Fungicida antibotritico in sospensione concentrata

CARATTERISTICHE

GRISU è un fungicida antibotritico attivo anche su sclerotinia, alternaria, maculatura bruna e moniliosi. Agisce per contatto ed è altamente selettivo sulle colture ortofrutticole ed industriali.

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
VITE	Botrite	150 ml/hl (1,5 l/ha) intervento preventivo nelle fasi di maggior recettività del grappolo	28 gg
PERO	Maculatura bruna	150 ml/hl (2,25 l/ha) da fine fioritura in poi, cadenzando ad intervalli di 8-10 giorni	21 gg
PESCO, NETTARINE	Moniliosi	150 ml/hl (2,25 l/ha) a protezione d ella fioritura o su frutti sviluppati)	3 gg
FRAGOLA	Botrite	1,5-2 l/ha da inizio fioritura ad intervalli di 7-10 gg in serra e 10-14 gg in pieno campo	21 gg
POMODORO	Botrite e Alternaria	150-200 ml/hl (1,5-2 l/ha) interventi preventivi in funzione delle condizioni climatiche ad intervalli di 7-10 giorni	14 gg in serra
LATTUGHE E SIMILI (con l'esclusione di crescione e altri germogli e gemme, barbarea, senape juncea)	Botrite e Sclerotinia	150-200 ml/hl (1,5 l/ha) interventi preventivi da post trapianto o da 2-3 foglie vere su colture seminate	14 gg in serra 21 gg in pieno campo
COLZA	Alternaria e Sclerotinia	1-1,5 l/ha intervenire alla prima comparsa dei sintomi	48 gg

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.