GOLTIX® STAR

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H410 - EUH401

FORMULAZIONE:	COMPOSIZIONE:	HRAC:	N. REGISTRAZIONE:
Microgranulare idrodispersibile	Metamitron puro 60% (600 g/kg) Lenacil puro 5% (50 g/kg)	C1 C1	9322 del 03-09-1997

- In post-emergenza non trattare Barbabietole in stress vegetativo determinato da cause ambientali o parassitarie.
- Su terreni sciolti è consigliabile utilizzare i dosaggi inferiori.

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Barbabietola da zucchero	3 - 5 kg/ha	In pre-semina o in pre-emergenza	30 giorni
	1,5 - 2 kg/ha	In post-emergenza negli interventi frazionati con Barbabietole allo stadio di 2-4 foglie vere e ripetendo il trattamento dopo 8-10 giorni	
	0,6 - 0,8 kg/ha	In post-emergenza negli interventi a dosi ridotte alla nascita delle infestanti prevedendo 2-3 trattamenti	

Efficacia d'uso

Infestanti sensibili | Infestanti mediamente sensibili

SPECIE INFESTANTI CONTROLLATE	SPETTRO D'AZIONE
Amaranto (*Amaranthus* spp.)	
Anagallide (*Anagallis arvensis*)	
Aspraggine (*Picris echioides*)	
Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*)	
Camomilla (*Matricaria chamomilla*)	
Centocchio (*Stellaria media*)	
Erba morella (*Solanum nigrum*)	
Erba storna (*Thlaspi arvense*)	
Farinello (*Chenopodium album*)	
Miagro liscio (*Myagrum prefoliatum*)	
Papavero comune (*Papaver rhoeas*)	
Poligonacee (*Poligonum* spp.)	
Rapistro rugoso (*Rapistrum rugosum*)	
Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*)	
Rucola violacea (*Diplotaxis eruicoides*)	
Senape (*Sinapis* spp.)	
Stregona annuale (*Stachys annua*)	

MISURE DI MITIGAZIONE

Nessuna misura di mitigazione riportata in etichetta.

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.