



Avvertenza: **PERICOLO**
Indicazioni di pericolo:
H304 - H315 - H317
H336 - H410 - EUH401

PYRINEX® M22 è un prodotto di titolarità Dow AgroSciences Italia S.r.l.

FORMULAZIONE:

Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE:

Clorpirifos-metile 22,1% (225 g/l)

IRAC:

1B

N. REGISTRAZIONE:

11029 del 25-09-2001

- Insetticida fosfororganico ad azione tripla: contatto, ingestione e azione di vapore.
- Azione frenante sullo sviluppo di acari tetranichidi.
- Il prodotto non è miscibile con fitofarmaci a reazione alcalina.
- Non impiegare il prodotto sulle seguenti varietà di Melo: Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster e Gallia Beauty.

COLTURA	FITOFAGO	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Cimice asiatica, Carpocapsa, Tortricidi ricamatori, Cidia, Afidi, Miridi	200 ml/hl	Massimo 1 trattamento/stagione senza superare la dose di 4 l/ha. Buon effetto collaterale verso Mosca della frutta.	21 giorni
	Cocciniglie e Psille del Melo	200 - 250 ml/hl		
Mandarino e Clementino	Cocciniglie	250 ml/hl	Massimo 2 trattamenti/stagione con intervallo minimo di 110 giorni	21 giorni
Fragola	Tripidi, Nottue e Afidi	300 - 400 ml/hl (max 2,25 l/ha)	Massimo 1 trattamento/stagione	15 giorni
Pomodoro, Melanzana	Lepidotteri, Dorifora e Tripidi	1,5 - 2 l/ha (max 3 l/ha)	Massimo 1 trattamento/stagione	10 giorni
Mais	Piralide	300 ml/hl (max 4 l/ha)	Massimo 1 trattamento/stagione	21 giorni
Patata	Dorifora e Lepidotteri	2 l/ha	Massimo 1 trattamento/stagione	21 giorni
Vite da tavola e da vino	Punteruolo rosso	250 ml/hl	Nei luoghi pubblici distribuire preferibilmente nelle ore notturne utilizzando attrezzature a bassa pressione	-
	Tignole	100-150 ml/hl	Massimo 2 trattamenti/stagione per Vite da vino senza superare la dose di 3 l/ha con intervallo minimo di 14 giorni; massimo 1 trattamento/stagione per Vite da tavola senza superare la dose di 2,7 l/ha. L'eventuale aggiunta di olio migliora l'efficacia contro cocciniglie	15 giorni
	Cicaline	150 ml/hl		
Cocciniglie	200 ml/hl			
Pesco, Nettarino	Carpocapsa, Cidia, Anarsia, Miridi	200 ml/hl	Massimo 1 trattamento/stagione per impianti che richiedono volumi d'acqua di 1500 l/ha e 2 trattamenti a dosi dimezzate per giovani impianti che richiedono un volume d'acqua non superiore a 1000 l/ha. Non superare la dose di 4,5 l prodotto/ha. Buon effetto collaterale verso Mosca della frutta	15 giorni
	Cocciniglie	200-250 ml/hl		
	Tripidi	350 ml/hl		
Colza	Meligete	2 l/ha	Massimo 1 trattamento/stagione	21 giorni

MISURE DI MITIGAZIONE**Per proteggere gli artropodi non bersaglio**

fascia di sicurezza non trattata di:

- 30 m per Agrumi e Pomacee
- 5 m per Vite

Per proteggere le api: non applicare durante la fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività. Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura. Per applicazioni in frutteto assicurarsi che qualsiasi copertura in fiore sia falciata o pacciamata prima dell'applicazione.

Per proteggere gli organismi acquatici

fascia di rispetto non trattata e vegetata di

- 25-30 m + ugelli antideriva TVI + ultima fila trattata dall'esterno all'interno per Pomacee e Drupacee
- 25 m + ugelli antideriva TVI + ultima fila trattata dall'esterno all'interno per Agrumi
- 10 m + ugelli antideriva TVI + ultima fila trattata dall'esterno all'interno per Vite
- 10 m + ugelli antideriva (-90%) per Mais, Solanacee e Colza