

Folpec 50 sc

**FUNGICIDA LIQUIDO A BASE DI FOLPET.
SOSPENSIONE CONCENTRATA.**

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE (DA VINO):

Phomopsis: viticola (escoriosi): 2 trattamenti allo stadio di 7-8 foglie, a partire dal germogliamento e dopo circa 1 settimana) a 0.5-1.5 L/hL con un massimo di 3 L/ha per trattamento. Peronospora: applicare quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia fino a 28 giorni prima della raccolta a 0.2 – 2 L/hL con un massimo di 2 L/ha per trattamento. Massimo 10 applicazioni complessive per stagione.

POMODORO (IN CAMPO):

Alternaria spp. (alternariosi), Fulvia fulva (cladosporiosi), Colletotrichum coccodes (antracnosi), Septoria lycopersici (septoriosi), Botrytis cinerea (muffa grigia): effettuare un massimo di 4 trattamenti dallo stadio di 3-4 foglie fino a 7 giorni prima della raccolta a 0.25 - 0.5 L/hL con un massimo di 2.5 L/ha per trattamento.

POMODORO (IN SERRA):

Alternaria spp. (alternariosi), Fulvia fulva (cladosporiosi), Colletotrichum coccodes (antracnosi), Septoria lycopersici (septoriosi), Botrytis cinerea (muffa grigia): effettuare un massimo di 3 trattamenti dallo stadio di 3-4 foglie fino a 7 giorni prima della raccolta a 0.25-0.32 L/hL con un massimo di 3.2 L/ha per trattamento.



COMPOSIZIONE

FOLPET puro g 40 (500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

CONFEZIONE



COLORAZIONE

non colorato

CLASSIFICAZIONE

CLP: Attenzione - H317 - H319 -
H332 - H351 - H400

MISCIBILITÀ

Il prodotto non è miscibile con
Poltiglia bordolese, Polisolfuro e
Olio bianco.

TEMPO DI CARENZA

28 gg. vite
7 gg. pomodoro

REGISTRAZIONE

N. del 13714 del 9.11.2007

