

Tixal r sc

**FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO,
CON AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA.
SOSPENSIONE CONCENTRATA.**

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE:

contro Peronospora, 450 ml/hl, 2-4 trattamenti a cadenza di 12-14 giorni a partire da pre-fioritura.

POMODORO:

contro Peronospora, 450 ml/hl, 3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni.

ORTICOLE

(cavolo verza, carciofo, lattuga, pisello):

contro Peronospora, Alternaria, Bremia; 450 ml/hl, 2-3 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni.

FRAGOLA:

contro Fitoftora, 450 ml/hl, effettuare il trattamento 15-20 giorni dopo il trapianto e 30 giorni dopo il 1° intervento. Eventuale immersione delle piantine prima dell'impianto in soluzione al 3%.

FLOREALI E ORNAMENTALI:

contro Peronospora e Fitoftora, 450 ml/hl.




COMPOSIZIONE

METALAXIL puro g. 3,85
(= 50 g/L)
RAME metallo puro g. 15,4
(da Rame idrossido) (=200 g/L)
Coformulanti q.b. a g. 100

FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

CONFEZIONE



COLORAZIONE

Non colorato

CLASSIFICAZIONE

CLP: Attenzione - H317 - H410

MISCIBILITÀ

il prodotto non è compatibile con i preparati a reazione alcalina.

TEMPO DI CARENZA

60 gg. cavolo verza
40 gg. fragola
28 gg. vite
20 gg. pomodoro, pisello,
carciofo, lattuga

REGISTRAZIONE

N. 16534 del 16.02.2016

