

## FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DI OIDIO E ALTERNARIA PER LE COLTURE ORTICOLE

REFLECT è un fungicida ad azione preventiva a base di Isopyrazam attivo nei confronti di oidio e alternaria di pomodoro e carota, oidio di cucurbitacee, melanzana e peperone.

Grazie alla sua affinità per le cere delle foglie, Isopyrazam agisce formando un'efficace barriera protettiva in grado di resistere a dilavamento, raggi ultravioletti e metabolismo degradativo della pianta, garantendo un'azione duratura nei confronti dei patogeni.

REFLECT va applicato in maniera preventiva.

### FUNGICIDA



Orticole

#### COMPOSIZIONE

Isopyrazam 13,1%  
(125 g/l)

#### FORMULAZIONE

concentrato emulsionabile

#### INDICAZIONI DI PERICOLO (CLP)

ATTENZIONE

#### NUMERO DI REGISTRAZIONE

16318 del 10.03.17



### DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Carota (in pieno campo)	Alternaria ( <i>Alternaria dauci</i> ) Oidio ( <i>Erysiphe dauci</i> )	1	Max 2 trattamenti (14 giorni di intervallo)	14 gg
Pomodoro (in pieno campo)	Oidio ( <i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium lycopersici</i> ) Alternaria ( <i>Alternaria spp.</i> )		Max 2 trattamenti (7 giorni di intervallo)	1 gg
Pomodoro Melanzana (in serra*)	Oidio ( <i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium lycopersici</i> )			1 gg
Peperone (in serra*)	Oidio ( <i>Leveillula taurica</i> )			3 gg
Cetriolo, Zucchini, Melone, Anguria (in pieno campo e serra*)	Oidio ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> )			7 gg melone, anguria
Zucca (in pieno campo)	Oidio ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> )			1 gg cetriolo, zuccino
				7 gg

\* in attesa di registrazione per trattamenti in serra

### ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Garantire una uniforme bagnatura della vegetazione da trattare, applicando il prodotto con volumi d'acqua non superiori a 1000 l/ha (600 l/ha per la carota).

#### PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluzione. Completare il riempimento del serbatoio mantenendo in funzione l'agitatore. In alternativa usare apposito pre-miscelatore.

#### STRATEGIA ANTI RESISTENZA

Per limitare il rischio d'insorgenza di resistenze si consiglia di applicare il prodotto in via preventiva poiché gli interventi curativi aumentano il rischio di sviluppo di resistenze.

### CONFEZIONI



flaconi da 1 l  
in cartoni da 12 pezzi