U 46® D FLUID

RESISTANCE BREAKER

Indicazioni di pericolo CLP		Confezioni
 PERICOLO **Frasi H** H318, EUH401		1 L 
Gruppo HRAC O	**Marchio registrato** Gruppo Nufarm	**Titolare registrazione** Nufarm B.V.
Gruppo imballaggio –	**Trasporto ONU** –	**Classificazione ADR** –

Erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza per frumento, orzo, avena, segale

Caratteristiche: U 46 D Fluid è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici. Non essendo volatile riduce al minimo il rischio di danneggiare le colture sensibili vicine.

Composizione: **2,4 D** sale dimetilamminico 59,9 g (= 720g/l) pari a 49,8 g (= 600 g/l) di 2,4 D acido

Miscibilità: Non miscelabile con fungicidi e insetticidi.

Registrazione: N° 133 del 23-07-1971

Formulazione: SL - Liquido (concentrato) solubile in acqua

Colture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Frumento, Orzo, Avena, Segale (60 giorni)	**Erbe infestanti sensibili:** *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Ranunculus arvensis* (Ranuncolo dei campi), *Chenopodium album* (Farinello comune), *Sonchus arvensis* (Grespino dei campi), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa pastore comune), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Vicia* sp. (Veccia) **Erbe infestanti mediamente sensibili:** *Plantago* sp. (Plantaggini), *Anagallis arvensis* (Centocchio), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Taraxacum officinale* (Soffione), *Urtica urens* (Ortica minore), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Rumex acetosella* (Acetosa minore), *Euphorbia heliscopia* (Erba calenzuola), *Vicia angustifolia* (Veccia), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga)	0,6 - 1,2 l/ha	Dall'inizio dell'accestimento alla fine della levata, quando le infestanti sono in attiva crescita. Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti mediamente sensibili. Effettuare 1 solo trattamento per ciclo colturale.

Indicazioni per il corretto impiego - Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame. U 46 D Fluid non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con U 46 D Fluid devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

Gli Agrofarmaci riportati in questo catalogo sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni