SELECT®

Indicazioni di pericolo CLP		Confezioni
 PERICOLO **Frasi H** H304, H317, H319, H336, H411, EUH066, EUH208, EUH401		1 L 
Gruppo HRAC A	**Marchio registrato** Arysta Lifesciences S.A.S.	**Titolare registrazione** Arysta Lifesciences S.A.S.
Gruppo imballaggio –	**Trasporto ONU** –	**Classificazione ADR** –

Erbicida graminicida selettivo per barbabietola da zucchero e da foraggio, pomodoro e soia

Caratteristiche: Prodotto graminicida di post emergenza efficace sulle principali infestanti graminacee.

Composizione: **Cletodim** puro 25 g (240 g/l)

Miscibilità: Si consiglia di utilizzare il prodotto da solo.

Registrazione: N° 8796 del 06-03-1996

Formulazione: EC - Emulsione concentrata

Colture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Pomodoro (30 giorni)	Sorgo volgare o sorghetta *(Sorghum halepense)* sia da rizoma sia da seme, Giavone *(Echinochloa crus-galli)*, Setaria (*Setaria* sp.), Avena selvatica (*Avena* sp.), Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Loglio (*Lolium* sp.), Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Scagliola o falaride (*Phalaris* sp.), Giavone americano *(Panicum dichotomiflorum)*, Fienarola *(Poa* sp.*)*, ricacci di frumento *(Triticum* sp.*)* ed orzo *(Hordeum* sp.*)*	0,6 l/ha	Post emergenza delle erbe infestanti dallo stadio di tre foglie all'inizio dell'accestimento. Contro il *Sorghum halepense* da rizoma è consigliabile un doppio intervento (0,6 + 0,6); il primo quando è alto 20-30 cm ed il secondo dopo circa 15 giorni.
Soia, Barbabietola da zucchero e da foraggio (60 giorni)	Sorgo volgare o sorghetta *(Sorghum halepense)* sia da rizoma sia da seme, Giavone *(Echinochloa crus-galli)*, Setaria (*Setaria* sp.), Avena selvatica (*Avena* sp.), Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Loglio (*Lolium* sp.), Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)*, Scagliola o falaride (*Phalaris* sp.), Giavone americano *(Panicum dichotomiflorum)*, Fienarola *(Poa* sp.*)*, ricacci di frumento *(Triticum* sp.*)* ed orzo *(Hordeum* sp.*)*	0,6 l/ha	Post emergenza delle erbe infestanti dallo stadio di tre foglie all'inizio dell'accestimento. Contro il *Sorghum halepense* da rizoma è consigliabile un doppio intervento (0,6 + 0,6); il primo quando è alto 20-30 cm ed il secondo dopo circa 15 giorni.

Indicazioni per il corretto impiego - Select svolge una maggior efficacia con l'aggiunta di un bagnante. Non usare Select in previsione di un'imminente pioggia.

Gli Agrofarmaci riportati in questo catalogo sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni