BUMPER® P

Indicazioni di pericolo CLP	Confezioni
 ATTENZIONE **Frasi H** H319, H411, EUH208, EUH401	1 L - 5 L 

Gruppo FRAC	Marchio registrato	Titolare registrazione
3	ADAMA Makhteshim Ltd.	ADAMA Makhteshim Ltd.
Gruppo imballaggio	**Trasporto ONU**	**Classificazione ADR**
III	3082	9

Fungicida organico per la difesa di frumento, orzo e barbabietola da zucchero

Caratteristiche: Bumper P è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed eradicante, efficace contro numerosi funghi patogeni di barbabietola da zucchero, frumento e orzo.

Composizione: **Procloraz** puro 34,8 g (400 g/l)
Propiconazolo puro 7,8 g (90 g/l)

Registrazione: N° 9941 del 12-02-1999

Formulazione: EC - Emulsione concentrata

Colture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Barbabietola da zucchero (21 giorni)	Cercospora *(Cercospora beticola)*	1,1 l/ha	Trattare a partire dalla comparsa delle prime pustole; ripetere se necessario dopo 14-16 giorni. Su varietà a ciclo lungo, o quando si preveda di effettuare più di due trattamenti, si può anche applicare Bumper P a partire dal 2° trattamento.
	Oidio *(Erysiphe betae)*	1,1 l/ha	In caso di presenza contemporanea delle due malattie, l'Oidio risulta ben controllato dai trattamenti correttamente posizionati contro la Cercospora. Nelle zone ad elevata pressione di Oidio, se i sintomi della malattia si manifestano nella prima metà di giugno, effettuare un primo trattamento con un prodotto a base di zolfo e successivamente intervenire con Bumper P, ripetendo l'applicazione, se necessario, dopo 14-16 giorni. N.B. Effettuare massimo due trattamenti per anno.
Frumento tenero, frumento duro, orzo (40 giorni)	Cercosporella *(Pseudocercosporella herpotrichoides)*, Fusariosi (*Fusarium* sp.)	1,1 l/ha	Trattare allo stadio di fine accestimento/levata.
Frumento tenero, frumento duro (40 giorni)	Oidio *(Erysiphe graminis)*, Ruggine bruna *(Puccinia recondita)*, Ruggine gialla *(Puccinia striiformis)*, Ruggine nera *(Puccinia graminis)*, Septoriosi *(Septoria nodorum, S. tritici)*	1,1 l/ha	Una protezione completa, in caso di elevate pressioni della malattia, si ottiene con due trattamenti allo stadio di levata e di spigatura. In molti casi è sufficiente quest'ultimo. È opportuno comunque regolarsi sulla base delle circostanze ambientali, in modo particolare delle piogge, e della specifica sensibilità delle varietà. Effettuare complessivamente massimo due trattamenti per anno.
Orzo (40 giorni)	Oidio *(Erysiphe graminis)*, Ruggine *(Puccinia hordei)*, Elmintosporiosi o Macchie reticolari *(Pyrenophora teres)*, Rincosporio *(Rhyncosporium secalis)*	1,1 l/ha	Una protezione completa, in caso di elevate pressioni della malattia, si ottiene con due trattamenti allo stadio di levata e di spigatura. In molti casi è sufficiente quest'ultimo. È opportuno comunque regolarsi sulla base delle circostanze ambientali, in modo particolare delle piogge, e della specifica sensibilità delle varietà. Effettuare complessivamente massimo due trattamenti per anno.

Indicazioni per il corretto impiego - Il prodotto è nocivo per i pesci. Non contaminare corsi d'acqua. Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del preparato.

Gli Agrofarmaci riportati in questo catalogo sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni