ECODIAN® CIDIA

Confezioni	Marchio registrato
Confezione 1.000 pezzi	Isagro Spa
	Titolare registrazione Isagro Spa

MATER-BI.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
NEL RISPETTO DEL REG. (CE) N° 834/2007

Diffusori di feromone, in Mater-Bi®, per il disorientamento sessuale di *Cydia (Grapholita) molesta* - colorati in grigio

Caratteristiche: Il metodo del disorientamento consiste nella creazione di numerose tracce feromoniche predominanti, tali da competere con quelle delle femmine presenti, disorientando così i maschi nella loro ricerca. In questo modo, rendendo impossibile l'incontro tra i sessi, si impediscono gli accoppiamenti e di conseguenza lo sviluppo della popolazione successiva, nociva alla coltura. Il "disorientamento" non interferisce con l'agroecosistema e può essere inserito sia nei programmi di difesa integrata che in quelli dell'agricoltura biologica. I diffusori Ecodian sono realizzati in materiale biodegradabile Mater-Bi® (marchio registrato Novamont S.p.A.), non presentano quindi problemi di accumulo nell'ambiente.

Composizione: **Z8-dodecenil acetato** 9,3 mg/diffusore
E8-dodecenil acetato 0,6 mg/diffusore
Z8-dodecenolo 0,1 mg/diffusore

Registrazione: N° 11554 del 20-01-2003

Formulazione: Mater-Bi - Diffusori in materiale biodegradabile

Colture (intervallo sicurezza)	Parassiti	Dosi	Modalità d'impiego
Pesco, Percoche, Nettarine	*Cydia (Grapholita) molesta*	2.000 diffusori/ha	Per frutteti di almeno 1 ettaro di superficie, con dimensione regolare e in presenza di densità iniziali di popolazione di Cidia non elevate. Tale numero va aumentato con popolazioni molto elevate, piante alte e vigorose.
Pomacee	*Cydia (Grapholita) molesta*	2.000 diffusori/ha	Per frutteti di almeno 1 ettaro di superficie, con dimensione regolare e in presenza di densità iniziali di popolazione di Cidia non elevate. Tale numero va aumentato con popolazioni molto elevate, piante alte e vigorose. Nel caso di una sola applicazione, installare i diffusori alla ripresa delle generazioni estive.

Indicazioni per il corretto impiego - Il buon esito della difesa è subordinato ai frequenti controlli sia delle trappole che dei germogli e dei frutti. L'efficacia di Ecodian Cidia può essere condizionata dai seguenti fattori:
- impropria conservazione dei diffusori;
- non corretta sistemazione dei diffusori nel frutteto;
- ritardo nell'epoca di applicazione dei diffusori;
- forma, estensione e ubicazione del frutteto;
- intensità di infestazione dell'anno precedente;
- mancata osservazione delle indicazioni fornite dalle trappole e dai controlli visivi.

ISAGRO S.p.A. pertanto, pur garantendo la costante qualità del prodotto, non assume alcuna responsabilità per la eventuale ridotta efficacia del metodo di lotta a seguito del mancato rispetto dei fattori sopracitati.

Gli Agrofarmaci riportati in questo catalogo sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni