
Siaram® 20 WG

BLU

Indicazioni di pericolo CLP	Confezioni
 ATTENZIONE **Frasi H** H410, EUH401	1 kg - 10 kg - 20 kg 

Gruppo FRAC	Marchio registrato	Titolare registrazione
M1	Isagro Spa	Isagro Spa
Gruppo imballaggio	**Trasporto ONU**	**Classificazione ADR**
III	3077	9

Fungicida rameico

Caratteristiche: Il prodotto è un fungicida in granuli idrodispersibili efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree.

Composizione: **Rame metallo** (da solfato neutralizzato con calce spenta) 20 g

Miscibilità: Non miscibile con agrofarmaci a reazione alcalina (polisolfuri, ecc.) e con quelli contenenti Tiram.

Registrazione: N° 13648 del 15-03-2007

Formulazione: WG - Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
NEL RISPETTO DEL REG. (CE) N° 834/2007

Colture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Vite (20 giorni)	Peronospora, Marciume nero degli acini, Melanosi, azione collaterale su Escoriosi, Rossore parassitario	500-1000 g/hl	In funzione delle condizioni climatiche (pioggia, temperatura, bagnature), dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva. Solitamente intervalli di 6-8 giorni tra i trattamenti assicurano risultati ottimali.
Melo (trattamenti fino alla fioritura)	Ticchiolatura	500-830 g/hl	Prima della fioritura, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche (pioggia, temperatura, bagnature), dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.
	Monilia, Cancro delle pomacee	830 g/hl	Intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme.
	Marciume del colletto	650-830 g/hl	Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 l di sospensione per pianta.
Pero (trattamenti fino alla fioritura)	Ticchiolatura, Septoriosi	500-830 g/hl	Prima della fioritura, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche (pioggia, temperatura, bagnature), dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.
	Monilia, Cancro delle pomacee	830 g/hl	Intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme.
	Marciume del colletto	650-830 g/hl	Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 l di sospensione per pianta.
	Colpo di fuoco batterico	500-830 g/hl	Trattamenti primaverili e invernali.
Agrumi (20 giorni)	Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Allupatura, Marciume o gommosi del colletto, Fumaggine, azione collaterale su Batteriosi	650-1000 g/hl	Intervenire mensilmente a partire dalla fine di Gennaio.
Cotogno (trattamenti fino alla fioritura)	Monilia, Cancro delle pomacee	830 g/hl	Intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme.
Mandorlo, Albicocco (trattamenti al bruno)	Corineo, Monilia	1300-2000 g/hl	Trattamenti invernali.
	Cancro batterico	500-1000 g/hl	Alla caduta delle foglie; effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.
Ciliegio (trattamenti al bruno)	Monilia, Bolla	1300-2000 g/hl	Trattamenti invernali.
	Marciume del colletto	650-1000 g/hl	Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 l di sospensione per pianta.
	Cancro batterico	500-1000 g/hl	Alla caduta delle foglie; effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.
Pesco, Nettarine, Percoche (trattamenti al bruno)	Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla	1300-2000 g/hl	Trattamenti invernali.
	Cancro batterico	500-1000 g/hl	Alla caduta delle foglie; effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.
Susino (trattamenti al bruno)	Corineo, Monilia, Maculatura batterica	1300-2000 g/hl	Trattamenti invernali.
	Cancro batterico	500-1000 g/hl	Alla caduta delle foglie; effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.
Fragola (3 giorni)	Marciume del colletto, Vaiolatura	450-500 g/hl	Intervenire alla ripresa vegetativa.

Gli Agrofarmaci riportati in questo catalogo sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni

Siaram® 20 WG

Colture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Olivo (20 giorni)	Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio o Occhio di pavone	500-1000 g/hl	Intervenire nelle epoche a maggior rischio infettivo (autunno, primavera).
Actinidia (20 giorni)	Marciume del colletto	650-1000 g/hl	Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
	Batteriosi *(Pseudomonas viridiflava)*	1000-1200 g/hl	Intervenire in autunno alla caduta delle foglie ed in primavera alla schiusura delle gemme.
Fruttiferi a guscio (nocciolo, castagno, mandorlo, noce, pino da pinoli, pistacchio), Fruttiferi vari (20 giorni)	Cancri rameali, Batteriosi	1000 g/hl	Trattamenti autunno-invernali
		500-800 g/hl	Trattamenti primaverili-estivi.
Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno (3 giorni)	Peronospora, azione collaterale su Muffa grigia e Marciumi batterici	450-650 g/hl	Intervenire iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
Pomodoro (3 giorni)	Cladosporiosi, Septoriosi, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero, azione collaterale su Muffa grigia, Alternariosi	450-650 g/hl	Intervenire iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
Melanzana (3 giorni)	Vaiolatura dei frutti, Moria delle piantine, azione collaterale su Muffa grigia, Alternariosi	450-650 g/hl	Intervenire iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino (3 giorni)	Maculatura angolare, Peronospora, azione collaterale su Muffa grigia, Marciume molle batterico	450-650 g/hl	Per melone, cocomero, zucca dose massima 4,4 kg/ha. Intervenire iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
Cavoli (20 giorni)	Peronospora, Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella, azione collaterale su Muffa grigia, Alternariosi	450-650 g/hl	Intervenire iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
Asparago (trattamenti dopo raccolta dei turioni)	Ruggine, azione collaterale su Muffa grigia	450-650 g/hl	Intervenire iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni. Limitare i trattamenti subito dopo la raccolta dei turioni.
Carciofo, Cardo (20 giorni)	Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle batterico	450-650 g/hl	Intervenire iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
Finocchio, Sedano, Prezzemolo (20 giorni)	Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano, azione collaterale su Marciume molle batterico	450-650 g/hl	Intervenire iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
Ortaggi a foglia ed erbe fresche, Legumi (20 giorni)	Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi	450-650 g/hl	Intervenire iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
Oleaginose (20 giorni)	Peronospora, Antracnosi	5-8 kg/ha	Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie.
Barbabietola da zucchero (20 giorni)	Cercospora, Peronospora, Ruggine	5-5,5 kg/ha	Intervenire iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Tabacco (20 giorni)	Peronospora, Batteriosi, Antracnosi	5-8 kg/ha	Intervenire iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Floreali, Ornamentali	Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi	500-1000 g/hl	Intervenire iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Cipresso	Cancro del cipresso	1300-2500 g/hl	Intervenire quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Patata (7 giorni)	Peronospora, Alternariosi delle solanacee	5 kg/ha	Intervenire iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

Indicazioni per il corretto impiego - Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. in tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio. Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.
Ortaggi a foglia: Cicoria, Crescione, Dolcetta, Indivia, Lattuga, Radicchio, Rucola, Scarola, Valerianella, Bietola da costa, Bietola da foglia, Spinacio.
Erbe fresche: Basilico, Cerfoglio, Erba cipollina, Maggiorana, Melissa, Menta, Prezzemolo, Rosmarino, Salvia, Timo.

Gli Agrofarmaci riportati in questo catalogo sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni