



## Fungicida ad azione preventiva e curativa

**Caratteristiche:** Il prodotto è una miscela di 2 fungicidi, il Mancozeb ad azione di contatto e il Dimetomorf ad azione citotropica, translaminare ed a sistemicità locale. Dimetomorf viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalle foglie e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini, mentre Mancozeb invece ha azione di coperura.


Il prodotto svolge, quindi, la triplice azione preventiva, curativa e antisporulante ed è attivo anche contro Black Rot ed Escoriosi della vite (*Phomopsis viticola*).

**Composizione:** Dimetomorf puro 9 g - Mancozeb puro 60 g

**Miscibilità:** Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

**Registrazione:** N° 13784 del 03-07-2007

**Formulazione:** WSB - Sacchetto solubile per polveri bagnabili

<b>Indicazioni di pericolo CLP</b>  ATTENZIONE <b>Frase H</b> H317, H361d, EUH401		<b>Confezioni</b> 1 kg (2x500 g idrosolubile) 5 kg (10x500 g idrosolubile) 
<b>Gruppo FRAC</b> 40/M3	<b>Marchio registrato</b> Adama Italia S.r.l.	<b>Titolare registrazione</b> Adama Italia S.r.l.
<b>Gruppo imballaggio</b> III	<b>Trasporto ONU</b> 3077	<b>Classificazione ADR</b> -

Colture (intervallo di sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Vite (28 giorni)	Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> )	200-220 g/hl (2-2,2 kg/ha)	Iniziare gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 10 giorni. Massimo 2 applicazioni per anno.
Pomodoro, Patata (pieno campo) (7 giorni)	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )	200 g/hl (2 kg/ha)	Iniziare gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 7 giorni. Massimo 4 applicazioni per anno.

**Indicazioni per il corretto impiego** - Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.