



LA NUOVA SOLUZIONE ERBICIDA DI PRE-EMERGENZA O POST-EMERGENZA PRECOCE DEL MAIS PER IL CONTROLLO DI GRAMINACEE E DICOTILEDONI.

LUMESTRA PACK 2.0 è la nuova soluzione erbicida di pre-emergenza o post-emergenza selettivo per il mais, assorbito dai semi in germinazione o per assorbimento radicale e fogliare. LUMESTRA PACK 2.0 controlla infestanti annuali, graminacee e dicotiledoni del mais.

LUMESTRA PACK 2.0 è disponibile in formato twin-pack (una tanichetta con due differenti serbatoi) composto da CALLISTO 480 ed ENCARIT. CALLISTO 480 ha come sostanza attiva il Mesotrione, mentre ENCARIT ha come sostanza attiva la Dimetenamide-p. Le due sostanze attive hanno meccanismi d'azione differenti: Mesotrione inibisce la formazione dei pigmenti carotenoidi e contemporaneamente impedisce le funzioni di protezione degli elementi cellulari, mentre Dimetenamide-p agisce inibendo la divisione cellulare delle infestanti target.

ERBICIDA



Mais

COMPOSIZIONE CALLISTO 480

Mesotrione 40%
(480 g/l)

FORMULAZIONE

sospensione concentrata

INDICAZIONI DI PERICOLO

ATTENZIONE



NUMERO DI REGISTRAZIONE

16481 del 22.8.16

COMPOSIZIONE ENCARIT

Dimetenamide-p 63,9%
(720 g/l)

FORMULAZIONE

concentrato emulsionabile

INDICAZIONI DI PERICOLO

PERICOLO



NUMERO DI REGISTRAZIONE

17454 del 2.8.19

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

INFESTANTI	COLTURE	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Sensibili Graminacee <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Panicum dichotomiflorum</i> , <i>Setaria</i> spp., <i>Sorghum halepense</i> da seme Dicotiledoni <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Datura stramonium</i> , <i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Polygonum persicaria</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Sinapis arvensis</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Stellaria media</i> Mediamente sensibili Dicotiledoni <i>Fallopia convolvulus</i> , <i>Mercurialis annua</i> , <i>Spergula arvensis</i>	Mais	CALLISTO 480 0,3 ENCARIT 1	LUMESTRA PACK 2.0 può essere impiegato dallo stadio di pre-emergenza allo stadio di 4 foglie del mais. In pre-emergenza: effettuare l'applicazione subito dopo la semina, su terreno fresco e umido o che verrà bagnato da successive piogge o irrigazioni. In post-emergenza precoce (stadio massimo di 4 foglie della coltura): trattare in condizioni di terreno umido, su vegetazione asciutta, evitando i periodi di elevate temperature. Applicare il prodotto con irroratori a media-bassa pressione e ugelli a ventaglio. In generale si consiglia l'utilizzo di ugelli antideriva.	60 gg mais da foraggio 90 gg mais da granella

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

LUMESTRA PACK 2.0 si distribuisce impiegando 100-400 l/ha di acqua.

CONFEZIONI

Twin Pack
per trattare 3 Ha
formato da
CALLISTO 480 (0,9 l)
ed ENCARIT (3 l)
in cartoni da 4 pezzi



ENCARIT è una registrazione BASF Italia