



PRINCIPALI SOLUZIONI: POSIZIONAMENTO IDEALE

AVVERSITÀ	"PIANTO"	GERMOGLIAMENTO	FOGLIE DISTESE	GRAPPOLI VISIBILI	GRAPPOLI SEPARATI	PRE-FIORITURA	FIORITURA	FINE FIORITURA	ALLEGAGIONE	ACCRESIMENTO ACINI	CHIUSURA GRAPPOLO	INVAIATURA	PRE-RACCOLTA
PERONOSPORA <i>(Plasmopara viticola)</i>						Electis [®] Trio WDG							
						Zoxium [®] 240 SC + partner (es. Cuneb, Kasko Met, ecc...)							
						Reboot [®]			Electis R FLOW				
						Fantic [®] F NC WG			Fantic [®] F NC WG				
						Genkotsu [®]			Genkotsu [®]				
	linea Airone [®]												
	Attività collaterale contro Escoriosi												
OIDIO <i>(Uncinula necator)</i>						Ibisco [®]							
						Antene [®] S							
						Domark [®] 125 Plus			IN STRETTA ALTERNANZA CON		Nabucco [®]		
						Regnum [®] 25 EC			Regnum [®] 25 EC				
BOTRITE <i>(Botrytis cinerea)</i>						POLYVERSUM [®]						Efficace anche contro Marciume acido	
						Fantic [®] F NC WG		OPPURE	Zoxium [®] 240 SC + partner		OPPURE	Electis [®] Trio WDG	
	Soluzioni antiperonosporiche con attività collaterale contro Botrite												
Altre avversità	Remedier [®]	MAL DELL'ESCA				TRIPIDI, ACARI, ERIOFIDI	UVA DA TAVOLA Dicarzol [®] 50 SP		SCAFOIDEO E CICALINE	Fitopyr [®] 2EC PRO			
						TIGNOLE	Astrel [®] WDG						
Efficienza trattamenti	MAGO [®] Coadiuvante speciale in miscela con Fungicidi e Insetticidi												

DIFESA VITE: tante soluzioni d'eccellenza per una produzione sostenibile



REBOOT®

FORMULAZIONE Granuli dispersibili
Zoxamide 33% + Cimoxanil 33%
INTERVALLO DI SICUREZZA 28 gg.
DOSE D'IMPIEGO 400-450 g/ha



ELECTIS® TRIO WDG

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili
Zoxamide 3,6% + Cimoxanil 2,8% + Fosetil Al 35%
INTERVALLO DI SICUREZZA 28 gg.
DOSE D'IMPIEGO 4-5 kg/ha



FANTIC® F NC WG

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili
Benalaxyl-M 3,75% + Folpet 48%
INTERVALLO DI SICUREZZA 28 gg.
DOSE D'IMPIEGO 2 kg/ha



GENKOTSU®

FORMULAZIONE Sospensione concentrata
Amisulbrom (200 g/l) 17,7%
INTERVALLO DI SICUREZZA 28 gg.
DOSE D'IMPIEGO 375 ml/ha



AIRONE® EXTRA

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili
Rame ossicloruro 10% + Rame idrossido 20%
INTERVALLO DI SICUREZZA 21 gg.
DOSE D'IMPIEGO 1-1,5 kg/ha



HATRICK® 30 WG

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili
Rame solfato tribasico 30%
INTERVALLO DI SICUREZZA 21 gg.
DOSE D'IMPIEGO 1,4-1,8 kg/ha



POLYVERSUM®

FORMULAZIONE Polvere bagnabile
Pythium oligandrum (ceppo M1) - min. 1x10⁶ UFC/g
INTERVALLO DI SICUREZZA 0 (zero) gg.
DOSE D'IMPIEGO 200-300 g/ha



REMEDIER®

FORMULAZIONE Polvere bagnabile
Trichoderma asperellum 2%+ T. gamsii 2% - min. 3x10⁷ UFC/g
INTERVALLO DI SICUREZZA 3 gg.
DOSE D'IMPIEGO 250 g/hl (min. 1 kg/ha)



DOMARK® 125 PLUS

FORMULAZIONE Microemulsione
Tetraconazolo (125 g/l) 11,6%
INTERVALLO DI SICUREZZA 30 gg.
DOSE D'IMPIEGO 240 ml/ha



IBISCO®

FORMULAZIONE Liquida
COS-OGA (12,5 g/l) 1,25%
INTERVALLO DI SICUREZZA 0 (zero) gg.
DOSE D'IMPIEGO 2-3 L/ha



ASTREL® WDG

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, ceppo ABTS 351 54%
INTERVALLO DI SICUREZZA -
DOSE D'IMPIEGO 50-100 g/hl



FITOPYR® 2EC PRO

FORMULAZIONE Concentrato emulsionabile
Piretrine (18,61 g/l) 2%
INTERVALLO DI SICUREZZA 1 gg.
DOSE D'IMPIEGO max 160 ml/hl



PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FORM.	INTERVALLO DI SICUREZZA	DOSE
AIRONE® PIÙ	Rame metallo 28% (ossicloruro 14% + idrossido 14%)	WDG	20 gg.	1,7-2,7 kg/ha
AIRONE® LIQUIDO	Rame metallo (272 g/l) 20% (ossicloruro 10% + idrossido 10%)	SC	20 gg.	2-4 L/ha
BUSSOLA® WG	Rame solfato neutralizzato con calce spenta 20%	WDG	21 gg.	3,5-5 kg/ha
CUNEB®	Fosfonato potassio (790 g/l) 54,5%	LS	15 gg.	0,75-2,5 L/ha
ELECTIS® R FLOW	Zoxamide (40 g/l) 2,85% + Rame (solfato tribasico) (266 g/l) 19,1%	SC	28 gg.	3 L/ha
KASKO® MET	Metalaxil 25%	PB	14 gg.	0,8 kg/ha
NABUCCO®	Metrafenone (500 g/l) 42,37%	SC	28 gg.	0,25 L/ha
REGNUM® 25 EC	Pyraclorobin (250 g/l) 23,6%	EC	35 gg. vite da vino 49 gg. vite da tavola	0,4 L/ha
ZOXIUM® 240 SC	Zoxamide (240 g/l) 21,8%	SC	28 gg.	0,625-0,75 L/ha
DICARZOL® 50 SP	Formetanate 50% Uva da tavola	PB-SI	Inizio fioritura	1 kg/ha

MAGO®

Per migliorare l'efficienza dei trattamenti fungicidi e insetticidi, aggiungere il coadiuvante speciale Mago (tensioattivo-adesivante, antischiuma e antideriva) anche in Agricoltura Biologica.



Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Usare con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

GOWAN ITALIA S.r.l. · Faenza (RA) · Tel. 0546 629911
gowanitalia@gowanitalia.it · www.gowanitalia.it

Gowan
ITALIA
l'affidabilità in agricoltura