

Zamir 18



- ▶ ACARICIDA DI DERIVAZIONE NATURALE
- ▶ AGISCE PER CONTATTO ED INGESTIONE SUGLI STADI MOBILI DEGLI ACARI TETRANICHIDI ED ERIOFIDI
- ▶ ELEVATA MOBILITÀ TRANSLAMINARE
- ▶ CONTEMPORANEO CONTROLLO DI NUMEROSI INSETTI

COMPOSIZIONE
abamectina 1,84% (18 g/l)

FORMULAZIONE
concentrato emulsionabile (EC)

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: H302; H319; H373; H410; EUH401

REG. MIN. SALUTE
n° 13927 del 13.09.2007

CODICE IRAC
6

BUFFER ZONE
Consultare l'etichetta



Attenzione

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	ml/ha	l/ha	NOTE	MAX
Pomodoro, Peperone	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.), Eriofide (<i>Aculops lycopersici</i>)	60	0,3-1,2	Alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 7 gg) Su peperone: Non utilizzare nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	Alla comparsa delle prime larve	
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	Alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 gg	
Cetriolo e Zucchini	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.), Eriofidi	60	0,3-1,2	Alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 7 gg). Non utilizzare nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	Alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 gg	
Melanzana	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.), Eriofidi	60	0,3-1,2	Alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 gg)
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	Alla comparsa delle prime larve	
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	Alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 gg	
Melone, Cocomero, Zucca	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.), Eriofidi	60	0,3-1,2	Alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 gg). Non utilizzare nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	Alla comparsa delle prime larve	
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	Alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 gg	
Fragola	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.)	60	0,3-0,8	Alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 7 gg). Non utilizzare nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
Lattughe, Dolcetta, Valerianella, Gallinella e Prodotti baby leaf	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,5	Alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione	Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 14 gg) per lattughe, dolcetta, valerianella, gallinella. Max 4 applicazioni per anno (intervallo min 14 gg) per prodotti baby leaf. Non utilizzare nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)			Alla comparsa delle prime larve	
	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.)			Alla comparsa dei primi stadi mobili	

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	ml/ha	l/ha	NOTE
Colture ornamentali e floricole in terra ed in vaso Vivai di arbustive ed arboree	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	50	0,5-1,2	Alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, intervenire ogni 7-10 gg
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,5-1,2	Alla comparsa delle prime larve
	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.)	25-50	0,5-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili
Latifoglie, Conifere per alberature stradali e parchi	Minatrici fogliari (<i>Cameraria ohridella</i>), Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)	10-40 ml per litro di acqua		Iniettare il prodotto subito dopo la fioritura. Iniettare in presenza delle prime larve neonate. Effettuare max 2 applicazioni per anno (intervallo 15-45 gg)
	Tingide del platano (<i>Corythucha ciliata</i>), Afidi (<i>Aphis</i> spp.), Acari tetranichidi ed eriofidi			Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante. Effettuare max 2 applicazioni per anno (intervallo 15-45 gg). L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere sversamenti accidentali.
Palme ornamentali in campo, aree urbane, vivai	Punteruolo rosso delle palme (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>)	50-100 ml per litro d'acqua		Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante. Effettuare max 2 applicazioni per anno (intervallo 15-45 gg). L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere sversamenti accidentali.
TUTTE LE COLTURE IN ETICHETTA	INSETTI			Vedere indicazioni a pag. 100

Prodotto originale Syngenta

FLACONE 0,5 litri (cartone 20 pz) TANICA 3 litri (cartone 6 pz)



AVVERTENZE

AGGIUNTA DI OLIO MINERALE: si consiglia di aggiungere olio minerale (Opalene, Agrumin) per applicazioni su Pero, Melo allo 0,25% (250 ml/ha), su Agrumi allo 0,5% (500 ml/ha) e per applicazioni estive su Pesco e Nettarine allo 0,1% (100 ml/ha). Non applicare su Margherita Shasta (*Leucantheum* spp.) gerbere e *Adiantum scutum*. ENDOTERAPIA: le applicazioni mediante iniezione al tronco devono essere effettuate con attrezzature idonee e da personale specializzato (vedi avvertenza in etichetta).

