

Axodife Ultra

AXODIFE ULTRA è un fungicida ad ampio spettro per barbabietola da zucchero e colture orticole. AXODIFE ULTRA è un fungicida sistemico con azione protettiva e curativa. Il principio attivo Azoxystrobin appartiene alla famiglia delle strobilurine, ha attività

protettiva, inibisce la germinazione delle spore, la crescita del micelio, la formazione degli organi di riproduzione. Il principio attivo Difenonazolo è un fungicida sistemico che appartiene al gruppo dei triazoli.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Azoxystrobin puro g 17,86 (= 200 g/L)
Difenonazolo puro g 11,16 (= 125 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

CLASSIFICAZIONE



ATTENZIONE
(H410; EUH401; EUH208)

11-51



FORMULAZIONE Sospensione concentrata

REG. MIN.SALUTE: In corso di registrazione

INTERVALLO DI SICUREZZA:

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero; 14 giorni per cipolla e carota, 7 giorni per carciofo, 3 giorni per pomodoro e melanzana.

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE	AVVERSITÀ	NOTE
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	0,5 - 0,8 l/ha	Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)	Alla prima comparsa dei sintomi BBCH 31-39. Numero max applicazioni 2 ogni 21 gg.
POMODORO	1 l/ha	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	Alla prima comparsa dei sintomi BBCH 20-59. Numero max applicazioni 2 ogni 8-10 gg.
		Alternaria (<i>Alternaria sp.</i>) Oidio (<i>Leveillula taurica</i>)	Numero max applicazioni 3 ogni 3/8-10 gg.
MELANZANA	1 l/ha	Oidio (<i>Oidium sp.</i>)	Alla prima comparsa dei sintomi BBCH 31-39. Numero max applicazioni 3 ogni 8-10 gg.
CARCIOFO	1 l/ha	Bremia (<i>Bremia sp.</i>)	Alla prima comparsa dei sintomi BBCH 41-81. Numero max applicazioni 2 ogni 8-10 gg.
CIPOLLA	1 l/ha	Ruggine (<i>Puccinia allii</i>)	Alla prima comparsa dei sintomi BBCH 41-49. Numero max applicazioni 2 ogni 14 gg.
CAROTA	1 l/ha	Alternaria (<i>Alternaria dauci</i>) Oidio (<i>Erysiphe heraclei</i>)	Alla prima comparsa dei sintomi BBCH 40-49. Numero max applicazioni 3 ogni 14 gg.

AVVERTENZE: Pericoloso per le api. Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori, non applicare il prodotto al momento della fioritura delle colture e delle infestanti. Non utilizzare quando le api sono in attività. Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura. Interrompere le applicazioni in pre-fioritura almeno 5 giorni prima dell'inizio della fioritura. Gli apicoltori devono rimuovere o coprire gli alveari durante e fino a 5 giorni dopo il trattamento.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto non è fitotossico se utilizzato sulle colture e alle dosi raccomandate.



Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto