

Feex®

FEEX® è un diserbante che agisce essenzialmente per contatto venendo assorbito localmente dalle foglie e dai germinelli e poco dalle radici; impiegato sulle seguenti infestanti: Coda di topo (*Alopecurus* spp.), Fienarola annua (*Poa annua*), Zizzania (*Lolium temulentum*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*),

Camomilla (*Matricaria* spp.), Centocchio (*Stellaria* spp.), Papavero (*Papaver* spp.), Peverina (*Cerastium* spp.), Ranuncolo (*Ranunculus* spp.), Veccia (*Vicia* spp.), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Vilucchio bianco (*Calystegia sepium*).

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro g 22 (= 240 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

FORMULAZIONE Emulsione concentrata

REG. MIN.SALUTE: N° 17348 del 09.07.2019

CLASSIFICAZIONE



Pericolo

(H304; H336; H410)

1 l



SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE	NOTE
VITE - POMACEE DRUPACEE - NOCCILO ARANCIO - LIMONE POMPELMO	1,875 l/ha	Impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari, intervenendo in pre-emergenza delle malerbe nel tardo autunno - inizio inverno, su terreno pulito e quando le stesse cominciano a germinare alla dose di 1,875 l/ha di superficie effettivamente trattata; ed in post - emergenza delle malerbe ricorrendo a miscele con altri principi attivi, intervenendo quando le malerbe hanno germogli lunghi non meno di 20 cm e sono in attiva crescita alla dose di 1,875 l/ha di superficie effettivamente trattata.
GIRASOLE	1 l/ha	Impiegare su colture seminate a file di almeno 70-75 cm di larghezza con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza. Intervenire in pre-emergenza della coltura a 1 l/ha di superficie effettivamente trattata; eventuali sintomi di fitotossicità scompaiono in breve tempo.
CARCIOFO	1-1,875 l/ha	Il prodotto può essere impiegato solo lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm di larghezza. In pre-emergenza della coltura, subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura, alla dose di 1-1,5 l/ha di superficie effettivamente trattata; ed in post-emergenza della coltura alla dose di 1,875 l/ha di superficie effettivamente trattata. Raccomandabile è proteggere il carciofo con opportuni ripari.
VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI	1,875 l/ha	Impiegare il prodotto solo su impianti con file poste ad almeno 1 m di distanza tra le file con applicazioni localizzate lungo le file, in bande di non oltre 30 cm di larghezza. In pre-emergenza delle infestanti annuali, trattando uniformemente la superficie alla dose di 1,875 l/ha di superficie effettivamente trattata in 400 - 800 litri di acqua. Per combattere il Convolvolo fare due trattamenti, il primo ad inizio fioritura ed il secondo su ricacci lunghi 40 - 50 cm. Sulle essenze resinose distribuire il prodotto sulla vegetazione ma prima della emissione dei nuovi germogli; su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa.

COMPATIBILITÀ

Compatibile con paraquat, dalapon, diquat e glifosate.

AVVERTENZE

In tutte le colture il prodotto deve essere impiegato solo con applicazioni in bande lungo la fila nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare in giornate con presenza di vento onde evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture sensibili.

