

Probus

PROBUS è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais e per le aree extragricole, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

MAIS: Infestanti sensibili

- Graminacee: *Echinochloa crusgalli* (Giavone comune), *Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).

- Dicotiledoni: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Stellaria media* (Centocchio).

Infestanti mediamente sensibili:

- Graminacee: *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).

- Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp.* (Lappola).

COMPOSIZIONE

g 100 di prodotto contengono:
Nicosulfuron puro g 4,1 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

CLASSIFICAZIONE



(H410)

1l - 5l



FORMULAZIONE Olio dispersibile

REG. MIN. SALUTE: N° 17467 del 14.11.2019

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE	NOTE
MAIS	1-1,5 l/ha	La dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
AREE INDUSTRIALI, BORDI STRADALI, ARGINI E SEDI FERROVIARIE:	1-1,5 l/ha	Applicare PROBUS alla dose indicata in presenza delle infestanti nelle prime fasi di sviluppo. Il prodotto non ha azione residuale.

MODALITÀ DI IMPIEGO

PROBUS si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:

Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie

Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie

Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento

Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.

PROBUS si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con

temperatura inferiore a 10° C o superiore a 25° C ed in caso di "stress" idrici. PROBUS si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

AVVERTENZE

Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.

Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto. Al termine dei trattamenti diserbanti con PROBUS è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione ed adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in etichetta.



Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto