



Fungicida sistemico, a base di fosfonato di potassio

Cuneb® è un fungicida sistemico per il controllo della peronospora e di altre malattie fungine. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento. Manifesta una sistemica ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie non bagnate direttamente o formatesi dopo il trattamento. Agisce per stimolazione delle difese naturali della pianta (fitoalessine) e possiede anche una certa attività diretta sul fungo.

Una scelta vincente

Elevata sistemicità ascendente e discendente. Eccellente protezione anche della vegetazione non raggiunta direttamente dal trattamento. Prolungata efficacia, anche sulla nuova vegetazione formata dopo il trattamento. Ottima miscibilità e sinergia con altri fungicidi.

Composizione

Fosfonato di potassio (790 g/l) **54,5%**
corrispondente al 35,2% (510 g/l)
di acido fosfonico

Formulazione

Liquido solubile

Confezioni



10 L

Registrazione

n° 18003 del 02.03.2022

Nessun pittogramma CLP

Modalità d'impiego

Nuovi impieghi

Culture	Avversità	Dosi (ml/hl)	Dosi (L/ha)	Note	N° max tratt./anno	Periodo carenza
Vite da tavola e da vino	Peronospora	250	0,75-2,5	Iniziare i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, a partire dal termine dello sviluppo delle foglie (BBCH > 20) e proseguirli ad intervalli di 10 giorni fino in prossimità della raccolta.	3	15 gg.
Agrumi: Arancio, Pompelmo, Limone, Mandarin, Pomelo, Limetta, Cedro, Arancio amaro, Bergamotto	Peronospora	150-250	1,5-7,5	Iniziare i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, a partire dal termine di accrescimento dei germogli (BBCH > 40), e proseguirli ad intervalli di 20 giorni fino in prossimità della raccolta.	2	15 gg.
Olivo	Occhio di pavone	150-250	1,2-2,5	Effettuare un trattamento in inverno e due trattamenti in primavera distanziati di 10 giorni. Iniziare i trattamenti a partire dal termine dello sviluppo delle prime foglie (BBCH > 20).	3	15 gg.
Cachi	Alternaria	150-250	2,5	Iniziare i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, a partire da quando i frutti raggiungono il 60% della dimensione finale e proseguirli ad intervalli di 15 giorni fino in prossimità della raccolta (BBCH 76-89).	3	20 gg.
Avocado	Peronospora	150-250	3,75	Iniziare i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, in tarda primavera/estate. Effettuare il 1° trattamento dall'inizio della fioritura alla caduta dei petali (BBCH 59-67); il secondo trattamento da quando il frutto ha una pezzatura di 10 mm fino all'acquisire il 50% della sua dimensione reale (BBCH 71-75); il 3° trattamento da quando il frutto acquisisce il 50% della sua dimensione finale fino alla maturazione (BBCH 75-85).	3	15 gg.
Ananas	Peronospora	-	6	Iniziare i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, dalla comparsa della 10° foglia e proseguirli ad intervalli di 20 giorni fino alla completa formazione del frutto (BBCH 10-79). In alternativa può essere effettuato un primo trattamento per immersione durante il trapianto alla dose di 150 ml/hl, ed un secondo tramite applicazioni fogliari 1 mese dopo il trapianto (BBCH 05-10) alla dose di 6 L/ha, corrispondenti a 150 ml/hl.	2	30 gg.
Frutti di piante arbustive, Piccola Frutta, Bacche*	Peronospora	150-250	0,45-2,5	Iniziare i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, a partire da quando i tralci raggiungono il 30% della dimensione finale e proseguirli ad intervalli di 10 giorni fino in prossimità della raccolta (BBCH 33-69).	3	7 gg.
Fragola (in serra)	Peronospora	150-250	0,45-2,5	Iniziare i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, a partire dalla comparsa della 2° foglia e proseguirli ad intervalli di 10 giorni fino a quando i primi frutti acquisiscono il colore caratteristico della varietà (BBCH 12-89).	3	7 gg.
Patata	Peronospora	150-250	2,5	Iniziare i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, a partire dalla comparsa della 2° foglia e proseguirli ad intervalli di 10 giorni fino alla maturazione dei tuberi (BBCH 12-49).	3	15 gg.
Lattughe e Insalate, Erbe fresche e Fiori commestibili*	Peronospora	150-250	0,45-2,5	Iniziare i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, a partire dalla comparsa della 2° foglia e proseguirli ad intervalli di 10 giorni fino in prossimità della raccolta (BBCH 12-49).	3	15 gg.
Pomodoro, Melanzana (in serra)	Peronospora	150-250	0,45-2,5	Iniziare i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, a partire dalla comparsa della 2° foglia e proseguirli ad intervalli di 10 giorni fino alla maturazione dei frutti (BBCH 12-89).	3	15 gg.
Peperone (in serra)	Peronospora	150-250	0,45-2,5			

* Dettaglio culture in etichetta.

Compatibilità

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.