

LEIMAY®



PROTEZIONE



FUNGICIDA
ANTIPERONOSPORICO A
BASE DI AMISULBROM

**MASSIMA RESISTENZA
AL DILAVAMENTO**



AZIONE SPECIFICA: SI FISSA ALLE CERE CUTICOLARI



FOCUS SUL PRODOTTO

- Elevata affinità alle cere
- Altissima persistenza
- Massima resistenza alla pioggia
- Ottima predisposizione ad associazione con altri principi attivi
- Eccellente attitudine all'associazione con antiperonosporici sistemici.

Caratteristiche

Amisulbrom appartiene al ristretto gruppo dei fungicidi "Qii" e "Quinone-inside-inhibitors" per questo motivo LEIMAY® costituisce la soluzione ideale nelle cosiddette strategie antiresistenza.

Si caratterizza per l'elevata attitudine a fissarsi nelle cere cuticolari che proteggono gli organi erbacei delle piante; caratteristica che si estrinseca nel parametro noto come "Log P - coefficiente di ripartizione Ottanolo /Acqua".

Percentuale di distribuzione nel tessuto vegetale


	1 GIORNO dopo l'applicazione			8 GIORNI dopo l'applicazione		
	Amisulbrom µg	Distribuzione % nella foglia	↓	Amisulbrom µg	Distribuzione % nella foglia	↓
Superficie	0.43	55	5	0.18	19	2
Strato cera epicutic.	0.33	42	4	0.76	78	> 7
Interno foglia	0.03	3	< 1	0.04	4	< 1

LEIMAY penetra molto rapidamente e svolge un'azione durevole in loco.

La migliore protezione contro la PERONOSPORA




LEIMAY® - Amisulbrom agisce combinandosi con l'enzima Ubiquinone Riduttasi (Qii) del complesso III della catena respiratoria mitocondriale dei funghi.



PROVE COMPARATIVE

Leimay: resistenza alla pioggia


Efficacia: 1 giorno dopo la pioggia simulata



LEIMAY[®] mantiene la stessa efficacia anche in presenza di pioggia, mentre nel fungicida di confronto si riduce drasticamente.

Prove condotte su Vite

VITE CV. "MERLOT" - N° 5 TRATTAMENTI PROVA 2017



LEIMAY[®] determina una minore presenza di Peronospora sia sul grappolo che sulle foglie.



LEIMAY®

FUNGICIDA
A BASE DI AMISULBROM
IN SOSPENSIONE CONCENTRATA



Applicazione
sulla pianta



FORMULAZIONE

Sospensione concentrata (SC)



CONFEZIONI

0,75 L (Cartone: 12x0,75)



CARENZA

3 giorni su pomodoro, melanzana e lattuga
7 giorni su patata
28 giorni su vite



MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Il prodotto risulta scarsamente compatibile con i preparati a reazione alcalina.



COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

AMISULBROM

g 17,70 (= 200 g/l)



REGISTRAZIONE

n. 14406 del 25/05/2012



CLASSIFICAZIONE

CLP



H351, H319, H410



COLTURE



PATOGENI



DOSE



NOTE

VITE	Peronospora della vite (<i>Plasmopara viticola</i>)	0,375 l/Ha ogni 10 giorni	Non effettuare più di 3 trattamenti per anno e non più di 2 trattamenti consecutivi.
PATATA (pieno campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	50 ml/hl (0,5 l//Ha) ogni 7-10 giorni	Non effettuare più di 4 trattamenti per anno.
POMODORO, MELANZANA	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	60 ml/hl (0,6 l//Ha) ogni 7-10 giorni	Non effettuare più di 3 trattamenti per anno.
LATTUGA	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	60 ml/hl (0,6 l//Ha) ogni 7 giorni	Non effettuare più di 3 trattamenti per anno.

**Si consiglia l'applicazione LEIMAY nel periodo ALLEGAGIONE-INVAIATURA
in miscela con TRICUP FLOW**

- La miscela risulta completa in quanto si ha la lunga persistenza dell'Amisulbrom.
- Un'altissima affinità alle cere superficiali e la capacità di immagazzinarsi nelle cere cuticolari.
- L'azione multisito del Rame abbassa i rischi di resistenze.
- Un basso apporto di Rame ad ettaro.



scam
NUTRIZIONE • PROTEZIONE • BIOSYSTEM

Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

EMAS
EUROPEAN
MANAGEMENT
SYSTEM

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI
CQY
CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI 11682:2019

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164
41126 Modena (ITALIA) - Tel. +39 059 586511 info@scam.it - **www.scam.it**

