

Grifon® FL

Composizione:	Rame da idrossido 10% + Rame da ossicloruro 10% (272 g/l)
Formulazione:	Sospensione concentrata
Classificazione tossicologica:	N
Registrazione N.	14155 del 02/04/2008
Confezioni:	1 L, 10 L
Giorni di carenza:	3 pomodoro, melanzana, fragola, cucurbitacee, ortaggi a bulbo 7 ortaggi a foglia, erbe fresche e patata 20 altre colture in etichetta



Iperion®

Composizione:	Rame da ossicloruro 37,5%
Formulazione:	Granuli idrodispersibili
Classificazione tossicologica:	N
Registrazione N.	10296 del 03/02/2000
Confezioni:	1 kg, 10 kg, 20 kg
Giorni di carenza:	3 pomodoro, melanzana, fragola, cucurbitacee, ortaggi a bulbo 7 giorni patata 20 altre colture in etichetta



Grifon® PIÙ (WG)

Composizione:	Rame da idrossido 14% + Rame da ossicloruro 14% (280 g/Kg)
Formulazione:	Granuli idrodispersibili
Classificazione tossicologica:	Xi, N
Registrazione N.	12748 del 31/07/2009
Confezioni:	1 kg, 10 kg
Giorni di carenza:	3 pomodoro, melanzana, fragola, cucurbitacee, ortaggi a bulbo 7 giorni patata e ortaggi a foglia

Novità 2010
Formulazione
in Granuli idrodispersibili
Efficacia a bassi dosaggi
e sicurezza di impiego



Siaram® 20 WG* e 20 GD**

Composizione:	Rame da solfato 20%
Formulazione:	Granuli idrodispersibili
Classificazione tossicologica:	Xi, N
Registrazione N.	13648 del 15/03/2007 (formulazione colorata)
Registrazione N.	11999 del 27/02/2004 (formulazione non colorata)
Confezioni:	1 kg, 10 kg, 20 kg
Giorni di carenza:	3 pomodoro, melanzana, fragola, cucurbitacee, ortaggi a bulbo 7 giorni patata e ortaggi a foglia ** 20 altre colture in etichetta

*Formulazione colorata

**Formulazione non colorata



Siapa

www.siapa-mi.it

Fungicida

Rameici Siapa



Preziosi come le tue colture



Formulati esclusivi e l'innovativa tecnologia WG
in una gamma completa con nuovi vantaggi d'impiego

In esclusiva per i Consorzi Agrari

Siapa

Coltura	Patogeno	IPERION		S. RAMEDIT BLU WG		PASTA SIAPA F BLU ed NC		GRIFON FL		GRIFON PIÙ (WG)		SIARAM 20 WG* e 20 GD**	
VITE E FRUTTIFERI		Dose g/hl	Giorni di carenza	Dose g/hl	Giorni di carenza	Dose ml/hl	Giorni di carenza	Dose ml/hl	Giorni di carenza	Dose g/hl	Giorni di carenza	Dose g/hl	Giorni di carenza
AGRUMI (Arancio, Bergamotto, Cedro, Chinotto, Clementino, Limetta, Limone, Mandarino, Pomelo, Tangerino)	Antracnosi degli agrumi, Batteriosi, Cancro gommoso, Mal secco degli agrumi, Marciume o gommosi del colletto	250-300	20	300-350	20	350	20	400-450	20	350-450	20	650-1000	20
DRUPACEE (Pesco - Nettareine e Percoche -, Albicocco, Susino, Ciliegio dolce e acido, Mandorlo)	Batteriosi	500-600	Trattamenti invernali	500-600	Trattamenti invernali	550-700	Trattamenti invernali	600-700	Trattamenti invernali	600-700	Trattamenti invernali	500-1000	Trattamenti invernali
	Bolla	500-600		600-700		550-700		700-900		700-900		1300-2000	
	Cancro delle drupacee	500-600		600-700		550-700		700-900		700-900		1300-2000	
	Corineo	500-600		600-700		550-700		700-900		700-900		1300-2000	
	Monilia	500-600		600-700		550-700		700-900		700-900		1300-2000	
FRAGOLA	Marciume del colletto	400-500	3	450-600	3	500-600	3	700-800	3	700-800	3	650-1000	3
	Marciume del colletto	200-300		250-350		350-400		350-400		350-400		450-500	
	Batteriosi	-		-		-		-		-		-	
ACTINIDIA	Vaiolatura della fragola	200-300	20	250-350	20	350-400	20	700-800	20	700-800	20	450-500	20
	Marciume del colletto	400-500		450-600		500-600		-		-		650-1000	
	Batteriosi	-		-		-		-		-		1000-1200	
FRUTTIFERIA A GUSCIO (Castagno, Nocciolo, Noce) p= trattamento primaverile; i= trattamento invernale	Cancri, Necrosi e Carie del legno	200 p/ 450 i	20	300 p/ 500 i	20	400 p/ 450 i	20	550 p/ 600 i	20	550 p/ 600 i	20	800 p/ 1000 i	20
ALTRI FRUTTIFERI (Corbezzolo, Fico*, Gelso, Giuggiolo, Lampone, Kaki*, Melograno*, Mirtillo - rosso e nero -, Nashi, Nespolo, Ribes - rosso e nero -, Mora, Sorbo, Uva spina)	Cancri rameali, Antracnosi, Batteriosi	-	-	-	-	-	-	-	-	550 p/ 600 i *	20 *	800 p/ 1000 i	20
OLIVO	Occhio di pavone, Fumaggine, Lebbra, Piombatura, Rogna	250-350	20	300-400	20	350	20	450	20	450	20	500-1000	20
POMACEE (Melo, Pero, Cotogno) p=trattamento primaverile; i= trattamento invernale	Colpo di fuoco batterico	200-250	Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura	250-300	Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura	200-300	Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura	250-400	Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura	250-350	Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura	500-830	Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura
	Marciumi e necrosi del colletto	400-500		500		450		600		700-800		650-830	
	Monilia	250 p/ 450 i		300 p/ 500 i		300 p/450 i		250-400 p/ 600 i		350 p/ 610 i		500-830	
	Nectria	250 p/ 450 i		300 p/ 500 i		300 p/450 i		220-250		250 p/ 350 i		500-830	
	Ticchiolatura	250 p/ 450 i		300 p/ 500 i		300 p/450 i		250-400 p/ 600 i		350 p/ 610 i		500-830	
	Septoriosi del pero	250 p/ 450 i		300 p/ 500 i		300 p/450 i		250-400		350 p/ 610 i		500-830	
VITE	Marciume o gommosi del colletto, Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Peronospora, Rossore parassitario	200-300 (max 400)	20	200-350 (max 450)	20	200-300 (max 400)	20	200-300 (max 400)	20	200-300 (max 400)	20	500-1000	20
ORTAGGI													
ORTAGGI A BULBO (Aglione, Cipolla, Scalogno)	Marciume batterico, Muffa grigia, Peronospora	250-350	3	300-400	3	350-400	3	350-400	3	350-400	3	450-650	3
CUCURBITACEE (Cetriolo, Cocomero*, Melone*, Zucca*, Zucchini)	Maculatura angolare, Marciume molle batterico, Muffa grigia, Peronospora delle cucurbitacee	250-350 (*max 2,3 kg/ha)	3	300-400 (*max 2,7 kg/ha)	3	350-400 (*max 2,3 kg/ha)	3	350-400 (*max 2,3 l/ha)	3	350-400 (*max 3,1 kg/ha)	3 (Cetriolo, Cetriolino, Zucchini, Melone)	450-650 (*max 4,4 kg/ha)	3
ORTAGGI A FOGLIA (Cicoria, Indivia, Lattuga, Radicchio, Rucola, Rutabaga, Scarola, Spinacio, Valerianella)	Antracnosi, Batteriosi, Cercospora, Peronospora	250-350	20	300-400	20	350-400	20	350-400	7	-	-	450-650	20 (7)**
ERBE FRESCHE (Basilico, Erba cipollina, Prezzemolo)	Ruggini, Antracnosi, Batteriosi, Cercospora, Peronospora	250-350	20	300-400	20	350-400	20	350-400	7	-	-	450-650	20 (7)**
POMODORO	Alternaria, Batteriosi, Cladosporiosi, Marciume zonato, Muffa grigia, Peronospora, Vaiolatura	250-350	3	300-400	3	350-400	3	350-400	3	200-400	3	450-650	3
PATATA	Alternaria, Peronospora	2,5-2,7 kg/ha	7	3 kg/ha	7	2,5-3 l/ha	7	3,5-4 l/ha	7	3,5-4 kg/ha	7	450-650	7
MELANZANA	Alternariosi, Antracnosi, Morte delle piantine, Muffa grigia	250-350	3	300-400	3	350-400	3	350-400	3	350-400	3	450-650	3
CAVOLI (Cavolfiore, C. bianco, C. broccolo, C. cappuccio, C. cinese, C. Bruxelles, C. nero, C. rapa, C. riccio, C. rosso, C. verza)	Alternaria, Marciume molle batterico, Marciume nero del cavolo, Micosferella del cavolo, Muffa grigia, Peronospora del cavolo, Ruggine bianca	250-350	20	300-400	20	350-400	20	350-400	20	350-400	20	450-650	20
LEGUMI (Cece, Cicerchia, Fagiolino, Fagiolo, Fava, Lenticchia, Lupino, Pisello)	Antracnosi, Batteriosi, Cercospora, Peronospora	250-350	20	300-400	20	350-400	20	350-400	20	350-400	20	450-650	20
TABACCO	Peronospora	2,5-3 kg/ha	20	3-3,5 kg/ha	20	2,5-3 l/ha	20	3,5-4 l/ha	20	3,5-4 kg/ha	20	5-8 kg/ha	20
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Cercospora, Peronospora, Ruggine	2,5-3 kg/ha	20	3-3,4 kg/ha	20	2,5-3 l/ha	20	3,5-4 l/ha	20	3,5-4 kg/ha	20	5-5,5 kg/ha	20
ASPARAGO	Muffa grigia, Ruggini	250-350	trattamenti subito dopo la raccolta	300-400	trattamenti subito dopo la raccolta	350-400	trattamenti subito dopo la raccolta	350-400	trattamenti subito dopo la raccolta	350-400	trattamenti subito dopo la raccolta	450-650	trattamenti subito dopo la raccolta
CARCIOFO, CARDO	Marciume molle batterico, Peronospora	250-350	20	300-400	20	350-400	20	350-400	20	350-400	20	450-650	20
FINOCCHIO, SEDANO, PREZZEMOLO	Cercosporiosi, Marciume molle, Septoriosi	250-350	20	300-400	20	350-400	20	350-400	20	350-400	20	450-650	20
PORRO	Antracnosi, Batteriosi, Cercospora, Peronospora	-	-	-	-	-	-	350-400	20	-	-	-	-
OLEAGINOSE (Arachide, Canapa, Colza, Cotone, Girasole, Lino, Ravizzone, Ricino, Senape, Sesamo, Soia)	Antracnosi, Peronospora	2,5-3 kg/ha	20	3-3,5 kg/ha	20	2,5-3 l/ha	20	3,5-4 l/ha	20	3,5-4 kg/ha	20	5-8 kg/ha	20
FLOREALI, ORNAMENTALI	Antracnosi, Batteriosi, Ruggini, Peronospora, Ticchiolatura	250-350	No	300-400	No	350	No	450	No	450	No	500-1000	No
CIPRESSO	Cancri rameali	800-1000	No	950-1100 kg/ha	No	700-1000	No	900-1400	No	900-1400	No	1300-2500	No
RISAIE	Disinfezione da alghe	2,5-3 kg/ha	No	3-3,5 kg/ha	No	2,5-3 l/ha	No	3,5-4 l/ha	No	-	-	5-8 kg/ha	No

Prima di impiegare il prodotto consultare attentamente l'etichetta ministeriale.

S. Ramedit® BLU WG

Composizione:	Rame da ossicloruro 32%
Formulazione:	Granuli idrodispersibili
Classificazione tossicologica:	N
Registrazione N.	I3799 del 18/05/2007
Confezioni:	1 kg, 10 kg, 20 kg
Giorni di carenza:	3 pomodoro, melanzana, fragola, cucurbitacee, ortaggi a bulbo 7 giorni patata 20 altre colture in etichetta



Pasta Siapa® F BLU e NC

Composizione:	Rame da ossicloruro 25% (377,5 g/l)
Formulazione:	Sospensione concentrata
Classificazione tossicologica:	N
Registrazione N.	I2780 del 19/09/2005 (formulazione colorata)
Registrazione N.	I2788 del 19/09/2005 (formulazione non colorata)
Confezioni:	1 L, 10 L
Giorni di carenza:	3 pomodoro, melanzana, fragola, cucurbitacee, ortaggi a bulbo 7 giorni patata e ortaggi a foglia 20 altre colture in etichetta

