Shogun®

Caratteristiche

Principio attivo
Propaquizafop 100 g/l

Formulazione
Concentrato emulsionabile

Classificazione
Xi N- Irritante, Pericoloso per l'ambiente

N. di registrazione
11660 del 18/03/2003

Tempo di carenza
Aglio, broccoli, carciofo, carota, cavolo cappuccio, cipolla, fagiolo, favino, melone, pisello, patata, pomodoro, spinacio, tabacco, asparago: 30 giorni.

Riso e Vivai di fruttiferi e specie ornamentali: non richiesto.

Girasole, colza, soia, cotone, barbabietola da zucchero: 60 giorni.

Lattughe e simili: 15 giorni.

Confezione
12 x 1 litro; 4 x 5 litri

Dose impiego
0,8 - 1,2 lt/ha

Seguire attentamente le indicazioni riportate in etichetta.

Shogun® è un marchio registrato di Makhteshim Agan.

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA

www.sumitomo-chem.it

Shogun®

Il "Generale" dei graminicidi

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA

Shogun®

Graminicida di post-emergenza

per colture orticole

Aglio

Asparago

Broccoli

Carciofo

Carota

Cavolo capp.

Cipolla

Fagiolo

Favino

Lattughe e simili

Melone

Pisello

Spinacio

per colture industriali a foglia larga

Barbabietola da zucchero

Colza

Girasole

Soia

Tabacco

Pomodoro

Patata

Riso

Vivai di fruttiferi e ornamentali

Rapidità d'azione

Assorbito entro un'ora dal trattamento. **Shogun®** viene assorbito per via fogliare e in minima parte anche radicale. Grazie all'attività sistemica viene trasferito nei meristemi apicali, provocando il blocco della attività vegetativa.
Il disseccamento completo e la morte delle infestanti avviene nel giro di 10-15 giorni.

Ampia etichetta

Numerose colture in etichetta.

Dose impiego

Si utilizza a dosi tra gli 0,8 e 1,2 litri/ha.
0,8 – 1 litro/ha: con infestanti nelle prime fasi di sviluppo.
1 – 1,2 litri/ha: su infestanti in accestimento.
Contro *Agropyron repens*, in caso di emergenza scalare da rizoma o di forte infestazione, potrebbe rendersi necessario un secondo trattamento a dose ridotta.

Elevata efficacia

Controlla tutte le più comuni infestanti graminacee estive e autunnali.

- *Agropyron repens* (falsa gramigna),
- *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe),
- *Avena spp.* (avena selvatica),
- *Cynodon dactylon* (gramigna),
- *Digitaria sanguinalis* (sanguinella),
- *Echinochloa crus-galli* (giavone),
- *Lolium spp.* (loglio),
- *Panicum dichotomiflorum* (giavone americano),
- *Panicum miliaceum*,
- *Phalaris spp.* (falaride),
- *Setaria spp.* (Setaria),
- *Sorghum halepense* (sorghetta) da seme e da rizoma,
- nascite spontanee di cereali.

Echinochloa crus-galli

Sorghum halepense

Panicum dichotomiflorum

Applicazione su riso

Il prodotto ha un'ottima attività contro le piante di riso crodo che infestano le risaie.
La tecnica di impiego prevede l'utilizzo della falsa semina che permette la germinazione del riso crodo.
Il trattamento con Shogun® deve essere effettuato in pre-semina della coltura quando la maggior parte delle piante di riso crodo sono emerse e su terreno sgrondato (umido).
La dose di impiego è di 0,75 – 1 litro/ha, in genere in miscela con prodotti a base di glifosate (2 – 3 litri/ha) per completare l'attività su altre infestanti presenti.

Gestione dell'acqua:
dopo l'applicazione aspettare almeno 24-48 ore prima di reimmettere l'acqua nella risaia e farla scorrere per almeno altre 48-72 ore prima della semina.

Nonostante la formulazione di Shogun® contenga già un bagnante appropriato, in determinate situazioni potrebbe essere conveniente l'aggiunta di Silwet Velonex, il "Super – Spalmatore" di nuova generazione.

I trattamenti estivi, effettuati spesso con temperature elevate e su infestanti in stress, oppure quelli su infestanti nelle primissime fasi di sviluppo e con una limitata superficie fogliare a disposizione per l'attività di contatto, rendono consigliabile aggiungere una dose di 150 ml/ha di Silwet Velonex.
Importante anche per migliorare l'efficacia su quelle infestanti che presentano una superficie fogliare tomentosa (*Digitaria, Setaria,* ecc.).