

Protil® EC

Protegge
il tuo
reddito

Fungicida
sistemico
a largo
spettro
d'azione



FUNGICIDA
Protil® EC
Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute.
Usare con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre
l'etichetta e le informazioni sui prodotti.





Protil® EC FUNGICIDA sistemico ad attività preventiva, curativa ed eradicante con ampio spettro d'azione

Caratteristiche

Protil® EC è un fungicida sistemico con ampio spettro di azione, indicato per la difesa da numerose malattie quali **Oidio, Ruggine, Septoriosi, Elimintosporiosi, Rincosporiosi e Cercospora**, che colpiscono le colture erbacee e arboree.

Viene assorbito rapidamente dai tessuti vegetali, sfuggendo all'azione dilavante delle piogge, e poi traslocato in senso acropeto, assicurando anche la difesa della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e il successivo.

Nei confronti dei patogeni esplica un'azione di tipo preventivo, curativo, eradicante ed è dotato di lunga persistenza di azione (3-5 settimane).

Scheda tecnica

Composizione:	Propiconazolo (250 g/l)	23,1%
Formulazione:	Emulsione concentrata	
Indicazione di rischio:	(N) Pericoloso per l'ambiente	
Registrazione Min. Salute:	n° 10426 del 29.03.2000	
Tempo di carenza:	Pesco, Albicocco 14 gg.; Riso 21 gg.; Frumento, Orzo, Segale, Avena 30 gg.; Vite 35 gg.	
Confezioni:	0,5 - 2,5 L	

Modalità d'impiego

Culture	Avversità	Dosi (ml/ha)	Note
Vite	Oidio	8 (max 80 ml/ha)	Pre-fioritura, interventi ogni 14 giorni.
		15 (max 150 ml/ha)	Post-fioritura, interventi ogni 14 giorni.
Pesco, Nettareina	Oidio	15-20	A partire dalla scamicatura, ogni 10-12 giorni in relazione al decorso della malattia.
		30-40 (0,3-0,4 l/ha)	Interventi in autunno-inverno.
		20-25 (0,2-0,25 l/ha)	Dai bottoni rosa in poi.
Pesco, Nettareina, Albicocco	Moniliosi	25 (0,25 l/ha)	Pre e post-fioritura (<i>Monilia laxa</i>). Pre-raccolta (<i>Monilia fructigena</i>).
Frumento, Orzo, Segale, Avena	Oidio, Ruggini, Septoria, Rincosporiosi, Elmintosporiosi, <i>Pseudocercospora</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Cladosporium</i>	0,5-0,6 l/ha	Intervenire alla levata ed in fioritura (limitandosi a quest'ultima in caso di attacchi meno pericolosi). Nell'orzo a semina autunnale può rendersi necessario un intervento in autunno.
Riso	Elmintosporiosi	0,5-0,6 l/ha	Intervenire alla prima comparsa dei sintomi. Se necessario ripetere il trattamento dopo un mese.
Rosa	Oidio	15 (150-300 ml/ha)	Interventi ogni 12-14 giorni.
Tappeti erbosi	Sclerotinia, Oidio, Ruggini	100-200 (max 1,6 l/ha)	Intervenire ogni 10-20 giorni.

Protil® EC è un marchio registrato Gowan Italia. Prodotto originale Maktheshim Agan.

Perché Protil® EC

- Azione preventiva, curativa ed eradicante
- Efficacia elevata e costante
- Basso dosaggio di impiego e ridotto impatto ambientale
- Triazolo con il miglior rapporto costo/benefici
- Utilizzabile nei disciplinari di produzione integrata
- Si acquista senza patentino
- Vasto campo d'impiego, compresi i tappeti erbosi
- Ammesso l'impiego anche in viticoltura

Gowan®
ITALIA
l'affidabilità in agricoltura

Gowan Italia S.p.A.
Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 629911 • Fax 0546 623943
gowanitalia@gowanitalia.it • www.gowanitalia.it