



RANMAN®

FUNGICIDA PER LA LOTTA CONTRO PERONOSPORA DI PATATA, POMODORO E CUCURBITACEE, IN PIENO CAMPO E SERRA



CARATTERISTICHE

RANMAN è un fungicida che presenta un'eccellente attività nei confronti dei funghi della classe Oomycetes, in modo particolare contro Peronospora (Phytophthora infestans e Pseudoperonospora cubensis). Svolge azione protettiva e deve pertanto essere applicato prima dell'attacco della malattia. A seconda della pressione della malattia, assicura un buon controllo per periodi di 7-10 giorni dal trattamento. RANMAN è una miscela di due componenti: RANMAN Componente A sospensione concentrata contenente 400 g/l di Cyazofamid e RANMAN Componente B coadiuvante organosiliconico. I due componenti, presenti nella stessa confezione ma separati in due differenti contenitori, vengono miscelati tra loro nel giusto rapporto al momento del versamento nella botte dell'irroratrice. È indispensabile al riguardo assicurarsi del completo svuotamento dei flaconi. Grazie alla sua selettività nei confronti di api, insetti e acari predatori o parassitoidi di

organismi nocivi, RANMAN può essere impiegato nei programmi di lotta integrata.

AVVERTENZE

Il contenuto del principio attivo Cyazofamid puro nella miscela dei due componenti corrisponde a 229 g/l. Iniziare i trattamenti contro la Peronospora al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, nel caso della Patata quando le piante chiudono le file. Sulle colture autorizzate, non eseguire più di 4 trattamenti nell'arco della stagione.

TRASPORTO ONU

3082

CLASSIFICAZIONE ADR

9

GRUPPO IMBALLAGGIO

III

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA	CONFEZIONE
Patata	Peronospora	0,35 l/Ha (0,2 l/Ha di RANMAN A + 0,15 l/Ha di RANMAN B)	Utilizzare volumi d'acqua di 200-400 l/Ha. Trattare ogni 7 giorni nei periodi di forte sviluppo della pianta o di forte pressione della malattia. Trattare almeno ogni 10 giorni nei periodi di debole attacco, specialmente dopo la fioritura	7 giorni	Twin Pack da 1,75 L (6x1,75) 
Pomodoro (in pieno campo e serra)	Peronospora	0,35 l/Ha (0,2 l/Ha di RANMAN A + 0,15 l/Ha di RANMAN B)	In pieno campo, utilizzare volumi d'acqua di 400-600 l/Ha. In serra, adeguare i volumi allo sviluppo della coltura, impiegando fino a 1000 l/Ha. Ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni.	3 giorni	
Cucurbitacee in pieno campo e serra (cetriolo, cetriolino, zucchini, zucca, melone, cocomero)	Peronospora	0,35 l/Ha (0,2 l/Ha di RANMAN A + 0,15 l/Ha di RANMAN B)	In pieno campo, utilizzare volumi d'acqua di 400-1000 l/Ha. In serra, adeguare i volumi allo sviluppo della coltura, impiegando fino a 1000 l/Ha. Ripetere i trattamenti ogni 7-8 giorni.	3 giorni	

RANMAN® è un prodotto di proprietà di Belchim Crop Protection Italia

COMPOSIZIONE

RANMAN A: Cyazofamid puro 34,78% (400 g/l)
RANMAN B: coadiuvante organosiliconico 84% (844,2 g/l)

FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

INDICAZIONI DI PERICOLO



Xn - Nocivo



N - Pericoloso per l'ambiente

N. REGISTRAZIONE

12578 del 22-03-2005