

# GEORT® 50

<b>Marchio registrato</b> Isagro Spa	<b>Indicazioni di pericolo</b> Xn, N, C	<b>Confezioni</b> 50 L - 1000 L
<b>Gruppo imballaggio</b> III		
<b>Trasporto ONU</b> 3267	<b>Frasi di rischio</b> R22, R31, R34, R43, R50/53	
<b>Classificazione ADR</b> 8		

## Fumigante del terreno

### Caratteristiche

Geort 50 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (mitc – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. Si utilizza su terreno nudo per trattamenti a terreni destinati alla semina o al trapianto di lattuga e simili, riso, pomodori, peperoni e melanzane, cucurbitacee, carote, ortaggi a tubero e a stelo, patate, tabacco, ripristino di vigneti e frutteti, fiori.

### Composizione

Metam sodium anidro 39,1 g (470 g/l)

### Miscibilità

Il prodotto si impiega da solo

### Registrazione

N°: 535 del 16-02-1972

### Formulazione

LF - Liquido fumigante



Colture	Dosi	Modalità d'impiego
Terreno nudo per trattamenti a terreni destinati alla semina o al trapianto di lattuga e simili, riso, pomodori, peperoni e melanzane, cucurbitacee, carote, ortaggi a tubero e a stelo, patate, tabacco, ripristino di vigneti e frutteti, fiori	430-520 l/ha. In presenza di terreni pesanti o infettati da Verticillosi, Fusariosi e Fialoforosi, la dose dovrà essere aumentata fino a 645-1030 l/ha, come pure andrà maggiorata in caso di impiego con bassa temperatura.	Dopo il trattamento irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre.

### Avvertenze

Il prodotto è fitotossico per tutte le colture e deve essere impiegato su terreno nudo almeno tre-quattro settimane prima della semina o del trapianto. Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e bestiame.