Oxford®



Fungicida citotropico translaminare contro peronospore

FORMULAZIONE:	COMPOSIZIONE:	N. REGISTRAZIONE:
Polvere bagnabile	Cimoxanil puro 20% (200 g/kg)	12934 del 27-12-2005

Caratteristiche

OXFORD è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro le malattie da peronospora di varie colture. OXFORD ha la capacità di agire sia sulle zoospore germinanti all'esterno della foglia, sia sul micelio nei primissimi stadi di sviluppo. Il prodotto ha una persistenza di 5 giorni in relazione al decorso delle condizioni metereologiche dopo il trattamento.

Consigli per l'uso

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di OXFORD in poca acqua: indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione. Non impiegare in serra.
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina (es. Poltiglia bordolese alcalina, Poltiglia solfocalcica). Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza, il prodotto deve essere impiegato secondo il criterio preventivo e in miscela estemporanea o in alternanza con altri fungicidi antiperonosporici.
Su colture orticole nel caso siano già comparsi i primi sintomi della malattia, intervenire con due trattamenti ravvicinati (distanziati non più di 4 giorni l'uno dall'altro) impiegando la dose più alta. OXFORD deve essere applicato in programmmi di difesa antiperonosporica che prevedono l'impiego di diversi principi attivi in miscela od in alternanza tra loro. La dose di OXFORD può essere dimezzata (50-60 g per 100 litri di acqua) qualora il prodotto venga impiegato in miscela con altri antiperonosporici utilizzati alle dosi autorizzate.

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Vite		60 – 70 g/hl	Da fase fenologica di periocolo infezioni (regola dei tre 10) fino a pre-raccolta	10 giorni
Colture orticole (carciofo, lattuga, spinacio, pomodoro, zucchini, pisello, cipolla, aglio, porro, melone, patata), tabacco e rosa	Peronospora	100 - 120 g/hl	Trattamenti preventivi	10 giorni per colture orticole, tabacco 14 giorni per patata 21 giorni per carciofo