



Brevis[®]

less is more...

Finalmente una soluzione semplice e affidabile per il dirado di melo e pero:
Brevis[®] per ottimizzare il tuo profitto grazie a produzioni di qualità.

ADAMA

Scheda tecnica

N. registrazione	n. 16084 del 16/05/2014
Composizione	Metamitron 150 g/kg Calcio formiato q.b.
Formulazione	Granuli idrosolubili (SG)
Colture	Melo, Pero
Epoca di applicazione:	8 – 10 mm
Dimensione media del frutto centrale	Eventuale seconda applicazione a 12-14 mm (entro i 16mm)
Dose	1,1 – 2,2 kg/ha per applicazione
Massimo Volume d'acqua consentito	1500 l/ha
Numero Massimo di trattamenti anno	2
Intervallo prima della raccolta	60 gg
Note	Non impiegare in miscela con altri prodotti

Brevis®
less is more...



in confezione da 500 g
scatola da 3 kg (500 g x 6 Pz)



ADAMA

ITALIA

44.500
ettari

MELE
SPECIALIZZATE

più di 2.000.000
di tonnellate
prodotte ogni anno

Trentino
Alto Adige

28.000
ettari

Veneto

5.000
ettari

Piemonte

4.500
ettari

Emilia Romagna

4.500
ettari

Lombardia


1.500
ettari

Friuli Venezia Giulia

1.000
ettari


Meccanismo d'azione

Brevis® blocca il trasporto non ciclico degli elettroni nel Fotosistema II. L'intercettamento della luce è disturbato generando competizione per i fotosintetati tra germogli e frutti. Ciò causa la cascola dei frutticini laterali in eccesso preservando il frutto centrale dominante.



Brevis® influisce negativamente sull'apparato fotosintetizzante nei giorni successivi l'applicazione, riducendo il trasporto lungo la catena di elettroni, fino ad oltre il 60%, in modo temporaneo generalmente per un massimo di 3 settimane. Durante questo periodo di stress vengono prodotti meno carboidrati il che, di conseguenza, innesca la cascola naturale dei frutti.

In generale a cadere sono i frutti laterali del mazzetto mentre il fiore centrale (il fiore più grande nel corimbo) viene preservato sulla pianta in quanto altamente competitivo.



Prova Laimburg 2012 - Varietà: Golden Delicious



Punti di forza di Brevis®

Massimizza il reddito migliorando la qualità del raccolto grazie ad un aumento della pezzatura, del colore e del grado zuccherino delle tue mele.

Ampia flessibilità di impiego con possibilità di un secondo trattamento. Efficace anche quando impiegato come unico prodotto diradante.

Elevata e costante efficacia diradante: un valido ed affidabile partner su tutte le varietà, incluse le più difficili da diradare quali Fuji e Red Delicious, sia in pianura sia in frutteti in montagna.

Migliora il ritorno a fiore stabilizzando la produzione ed evitando l'alternanza.

Formulazione speciale (SG) contenente Formiato di Calcio, un nutriente chiave per le pomacee.

Meccanismo di azione unico: non interagisce con il bilancio ormonale della pianta ed è meno influenzato da fattori ambientali.

Significativa riduzione delle ore di dirado manuale.

Sicuro nei confronti degli organismi utili, adatto ai programmi di lotta integrata.

Eccellente profilo tossicologico ed ecotossicologico.

Assenza di frutti pigmei.

Nessun effetto negativo sulla rugginosità.

Veloce assorbimento fogliare.

Nessun residuo alla raccolta.

Registrato anche su Pero.

Indicazioni d'uso

MAGGIORE EFFICACIA DI Brevis®	MINORE EFFICACIA DI Brevis®
Nuvolosità elevata (bassa radiazione solare)	Giornate soleggiate (alta radiazione solare)
Alte temperature notturne (maggiore consumo di fotosintetati)	Basse temperature notturne (minore consumo di fotosintetati)
Vegetazione rigogliosa (succhioni in competizione per fotosintetati)	Vegetazione poco rigogliosa; taille longue
Impianti in pianura (< radiazione solare e > T notturne)	Impianti in altura (< T notturne e > radiazione solare)
Piante giovani	Impianti vecchi e poco vigorosi
Clima Umido	Clima secco

Le cime risultano spesso la parte più difficile da diradare a causa della maggiore radiazione solare percepita, di una fase più avanzata del diametro dei frutticini - conseguenza di una fioritura anticipata - e della difficoltà di copertura da parte dei prodotti diradanti.

Per i motivi opposti, la parte basale delle piante è diradata più facilmente.

È quindi consigliabile chiudere gli ugelli basali dell'atomizzatore nel momento dell'applicazione ed eventualmente concentrare il secondo trattamento specialmente sulla cima.

Brevis® va usato da solo.

Vista la fondamentale importanza del trattamento diradante e gli eventuali problemi legati ad un sovradirado, è sconsigliato l'impiego di Brevis® con altri prodotti che potrebbero anche causare fenomeni di fitotoxicità. Per gli stessi motivi appena spiegati è assolutamente sconsigliato anche l'uso di oli o bagnanti.



Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

ADAMA

Adama Italia S.r.l. Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG) - Italia - www.adama.com