


Posizionamento



Applicare il prodotto ad intervalli di 10-12 giorni in funzione delle condizioni ambientali e di pressione della malattia

Avvertenze agronomiche

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE	TEMPO DI CARENZA	MRL (mg/Kg)
VITE	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	2,5 Kg/ha	42 gg	0,3

Allo scopo di prevenire l'insorgere di fenomeni di resistenza eseguire un massimo di tre trattamenti preventivi per stagione

Rispettare le regole delle buone pratiche agricole assicurando l'omogenea distribuzione della miscela fungicida sulle parti da trattare

Profilo del prodotto

Composizione: Benalaxyl* 8% + Mancozeb 65%

Formulazione: Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

Classificazione CLP: Attenzione


Confezione: 1 Kg



Posizionamento flessibile

Assorbimento veloce
e rilascio graduale

Doppia azione:
Preventiva e Curativa



←... diffusione nella linfa e fra le cellule
← diffusione nei lipidi

Liposolubilità = affinità per i lipidi
⇒ assicura l'assorbimento nella cuticola
Idrosolubilità = affinità per l'acqua
⇒ favorisce il trasporto della molecola attraverso il sistema linfatico e intercellulare

→ **Distribuzione ottimale**


Prodotto sistemico

Benalaxyl™

Partner sinergico

Preventivo e curativo

AZIONE PREVENTIVA con l'inibizione dell'RNA-polimerasi



AZIONE CURATIVA grazie alla rottura della membrana cellulare del fungo e con l'inibizione della germinazione delle zoospore

Efficacia sulla sporulazione dei conidi (%)



Benalaxyl è completamente efficace sulla sporulazione dei conidi, sia nelle applicazioni preventive che in quelle curative.



Vantaggi principali

- Veloce assorbimento cuticolare
- Lento rilascio del principio attivo all'interno dei tessuti vegetali
- Ottimale resistenza al dilavamento
- Prodotto sistemico con azione preventiva e curativa
- Basso impatto nell'ambiente
- Posizionamento flessibile
- Effetto collaterale su Escoriosi della vite