TMTD 50 SC

RICHIESTO PATENTINO

Anticrittogamico acuprico

Caratteristiche: Fungicida organico ad azione preventiva. Non contiene metalli, per cui può essere usato su colture sensibili, ad esempio, allo zinco ed al rame.

Composizione: **Tiram** (TMTD) puro 44 g (500 g/l)

Miscibilità: Il prodotto è miscibile con gli zolfi colloidali e bagnabili. Non è miscibile con i prodotti a base di rame.

Registrazione: N° 7845 del 27-06-1989

Formulazione: SC - Sospensione concentrata

Indicazioni di pericolo CLP



ATTENZIONE

Frasi H
H373, H410, EUH208, EUH401

Confezioni
1 L - 10 L - 20 L



Gruppo FRAC	Marchio registrato	Titolare registrazione
M3	Taminco Italia Srl	Taminco Italia Srl
Gruppo imballaggio	**Trasporto ONU**	**Classificazione ADR**
III	3082	9

Colture (intervallo di sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Melo (35 giorni)	*Venturia inaequalis* (Ticchiolatura), *Monilia* sp.	290-400 ml/hl (massimo 4,8 l/ha)	Massimo 4 trattamenti/anno.
Pero (35 giorni)	*Venturia pyrina* (Ticchiolatura), *Monilia* sp., *Stemphylium vesicarium* (Maculatura bruna)	290-400 ml/hl (massimo 4,8 l/ha)	Massimo 8 trattamenti/anno.
Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Mandorlo (pesco, albicocco 42 giorni, susino, ciliegio 14 giorni, mandorlo 150 giorni)	*Taphrina deformans* (Bolla), *Stigmina carpofila* (Corineo), *Monilia* sp.	600-800 ml/hl (massimo 4,8 l/ha)	Trattamenti autunno-invernali. Massimo 3 trattamenti/anno.
		320-480 ml/hl (massimo 4,8 l/ha)	Trattamenti primaverili-estivi. Massimo 3 trattamenti/anno.
Vite (35 giorni)	*Botrytis cinerea* (Muffa grigia)	400-640 ml/hl (massimo 4,8 l/ha)	Massimo 3 trattamenti/anno.
Fragola (7 giorni)	*Botrytis cinerea* (Muffa grigia)	320-480 ml/hl (massimo 4,8 l/ha)	Massimo 3 trattamenti/anno.
Lattughe e simili (20 giorni)	*Botrytis cinerea* (Muffa grigia), *Sclerotinia rolfsii* (Sclerotinia), *Rhizoctonia solani* (Rizoctonia)	320-480 ml/hl (massimo 4,8 l/ha)	Massimo 3 trattamenti/anno.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Zucchino, Carota, Rapa, Ravanello, Fagiolo, Fava, Pisello, Cece, Lenticchia, Asparago (10 giorni)	*Botrytis cinerea* (Muffa grigia), *Sclerotinia rolfsii* (Sclerotinia), *Rhizoctonia solani* (Rizoctonia)	320-400 ml/hl (massimo 4 l/ha)	Massimo 3 trattamenti/anno.
Floreali, Ornamentali	*Botrytis cinerea* (Muffa grigia)	400-640 ml/hl (massimo 4,8 l/ha)	
Disinfezione di sementi (ortaggi, cereali, oleaginose, ornamentali, barbabietola)	*Tilletia, Pythium, Fusarium* sp., *Phoma*	200 ml/100 kg di seme	

Indicazioni per il corretto impiego - Non deve essere impiegato su cultivars di pero: Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna. I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame ma devono essere distrutti nel rispetto delle norme vigenti sui rifiuti tossici. Nei trattamenti su colture orticole, floreali ed ornamentali, date le numerose varietà disponibili, effettuare prove su piccole superfici o consultare il personale tecnico prima di effettuare trattamenti generalizzati. Non trattare su piante con residui di prodotti a base di rame.