



Registrazione: N° 14165 del 05-03-2012
Composizione: Fluazinam 40 g (500 g/l)
Formulazione: SC - Sospensione concentrata
Confezioni: 1 L
Gruppo FRAC: 29

Classificazione

CLP

Indicazioni di pericolo

Pittogrammi:



Avvertenza: ATTENZIONE

FraSI H: H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica della pelle. H361d Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

DPD

Indicazioni di pericolo

Pittogrammi:



Xn – Nocivo

N – Pericoloso per l'ambiente

FraSI R: R38 Irritante per la pelle. R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

® Marchio registrato Nufarm Italia Srl

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.).

www.siapa.mi.it

Siapa

Alle radici del futuro



Lo specialista contro le malattie del pero e del melo



Siapa



ROTTURA GEMME

ORECCHIETTE DI TOPO

BOTTONI FIORALI VISIBILI

FIORITURA

CADUTA PETALI

FRUTTO NOCE

INGROSSAMENTO FRUTTO

Ticchiolatura

Maculatura bruna

intervalli 6-10 giorni

intervalli 12-14 giorni

NANDO
maxi

massimo 4 trattamenti anno

Dose: **100 ml/hl** (massimo 1,5 l/ha)

Intervallo sicurezza: **63 giorni**



ROTTURA GEMME

ORECCHIETTE DI TOPO

BOTTONI FIORALI VISIBILI

FIORITURA

CADUTA PETALI

FRUTTO NOCE

INGROSSAMENTO FRUTTO

Ticchiolatura

Alternaria

intervalli 6-10 giorni

intervalli 12-14 giorni

- **Formulato a base di *Fluazinam* registrato su pero e melo**
- **Azione multisito, evita le resistenze**
- **Ampio spettro di azione**
- **Grande selettività sui frutti**
- **Efficace a livello dei migliori standard**



AVVERTENZE - Distanziare di almeno 14 giorni l'impiego di Nando Maxi dagli interventi con gli olii estivi in genere (es. paraffinici).
Non miscelare Nando Maxi con preparati che contengono olio (EW, OD ed altri). Qualora l'olio sia utilizzato come bagnante/veicolante in miscela con altri agrofarmaci ed a concentrazioni che non superano lo 0,2% (=200 ml per 100 litri), indipendentemente dal volume di acqua distribuita per ettaro e dal tipo di atomizzatore utilizzato, l'intervallo di precauzione tra Nando Maxi ed il trattamento con olio può essere ridotto ad 8/10 giorni.