

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO CITOTROPICO- TRANSLAMINARE E DI COPERTURA PER VITE, POMODORO E PATATA

PERGADO SC & ZOMINEX Twin Pack è una combinazione di PERGADO SC e ZOMINEX.

PERGADO SC è un innovativo fungicida antiperonosporico per vite e colture orticole a base di Mandipropamid (mandelammide). Mandipropamid è altamente efficace nei confronti degli Oomiceti fogliari (peronospora), verso i quali agisce inibendo la germinazione delle zoospore, la crescita del micelio e la sporulazione. Inoltre è dotato di duplice attività, di contatto e citotropica-translaminare, e presenta un'elevata affinità per le cere di foglie e frutti, con evidenti vantaggi in termini di resistenza al dilavamento.

ZOMINEX è un antiperonosporico a base di Zoxamide, sostanza attiva appartenente al gruppo chimico delle benzamidi, del quale è l'unico rappresentante. PERGADO SC & ZOMINEX Twin Pack è una combinazione molto versatile durante l'intero ciclo colturale di vite, pomodoro e patata, molto efficace nei confronti della Peronospora e dotata di un profilo tossicologico molto favorevole. La formulazione liquida di alta qualità di entrambi i prodotti rende questa soluzione facile da dosare e sicura per l'operatore, usando guanti adatti e tuta completa da lavoro.

FUNGICIDA



Vite



Orticole

COMPOSIZIONE

PERGADO SC

Mandipropamid 23,3% (250 g/l)

FORMULAZIONE

sospensione concentrata

NUMERO DI REGISTRAZIONE

13382 del 19.1.09

INDICAZIONI DI PERICOLO (CLP)



COMPOSIZIONE

ZOMINEX*

Zoxamide pura 21,8% (240 g/l)

FORMULAZIONE

sospensione concentrata

NUMERO DI REGISTRAZIONE

15572 del 8.10.12

INDICAZIONI DI PERICOLO (CLP)

ATTENZIONE



DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURE	PARASSITI	Dosi (ml/hl)	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite	Peronospora	PERGADO SC: 50 - 60 ZOMINEX: 50 - 60	PERGADO SC: 0,5 - 0,6 ZOMINEX: 0,5 - 0,6	Interventi preventivi al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e, successivamente, ad intervalli di 8-12 giorni in funzione delle condizioni ambientali e della pressione dell'infezione.	28 gg
Pomodoro	Fitoftora Alternaria			Intervenire in presenza di condizioni sufficienti a determinare l'infezione e continuare ad intervalli di 7-10 giorni.	3 gg
Patata (solo in pieno campo)	Fitoftora				7 gg

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Si consiglia di utilizzare PERGADO SC & ZOMINEX Twin Pack in programmi di difesa in alternanza a RIDOMIL GOLD. In questo modo si ottiene un elevato livello di protezione dalla Peronospora durante le fasi di maggiore suscettibilità delle colture, e si previene l'insorgenza di fenomeni di resistenza. Effettuare al massimo 4 trattamenti all'anno con prodotti appartenenti al gruppo CAA e non più di 3 trattamenti consecutivi con PERGADO & ZOMINEX. Per un controllo contemporaneo dell'Oidio è possibile miscelare con TOPAS 10 EC, TOPAS COMBI LIQUIDO**, SCORE 25 EC, CIDELY, DYNALI sulle colture dove questi prodotti sono registrati. PERGADO SC & ZOMINEX Twin Pack è generalmente compatibile con i prodotti di comune impiego. Nella preparazione delle miscele estemporanee con formulati a compatibilità non nota, effettuare comunque preventivamente test di compatibilità fisico-chimica.

* Registrazione Gowan Italia SpA

** in attesa di registrazione

CONFEZIONI

PERGADO SC

1 flacone da 1 l

+

ZOMINEX

1 flacone da 1 l

in cartoni da 5 pezzi

