



Indicazioni di pericolo:
H411 - EUH401 - EUH208

FORMULAZIONE:

Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE:

Etofumesate puro 44,72% (500 g/l)

N. REGISTRAZIONE:

8483 del 30-03-1994

Caratteristiche

Agisce principalmente sui germinelli e sulle infestanti già nate per assorbimento radicale e fogliare. Per questo, sulla Barbabietola da zucchero, è impiegabile in pre e post-emergenza. Agisce sulle infestanti annuali graminacee (escluso *Lolium spp.*) e su alcune tra le più importanti e diffuse dicotiledoni.

Consigli per l'uso

Trattare su terreno umido. Intervenire in post-emergenza a partire dallo stadio di foglie cotiledonali della coltura e con infestanti nelle prime fasi dello sviluppo. In post-emergenza non trattare nelle ore più calde, con temperatura superiore a 23 - 24°C. Non superare la dose di 2 l/ha ogni 3 anni.

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Barbabietola da zucchero	2 l/ha	In pre-semina o pre-emergenza in miscela con GOLTIX, GOLTIX 50 WG	120 giorni
	1 - 1,2 l/ha	In post-emergenza con intervento unico in miscela con 2,5 l/ha di CONTATTO 320	
	0,4 - 0,5 l/ha	In post-emergenza con interventi frazionati in miscela con 1,5 l/ha di CONTATTO 320	



Efficacia d'uso

Infestanti sensibili

Infestanti
mediamente sensibili

SPECIE INFESTANTI CONTROLLATE	SPETTRO D'AZIONE
Amaranto (<i>Amaranthus spp.</i>)	Infestanti sensibili
Anagallide (<i>Anagallis arvensis</i>)	Infestanti sensibili
Attaccamani (<i>Galium aparine</i>)	Infestanti sensibili
Avena (<i>Avena spp.</i>)	Infestanti mediamente sensibili
Centocchio (<i>Stellaria media</i>)	Infestanti sensibili
Coda di volpe (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	Infestanti sensibili
Erba morella (<i>Solanum nigrum</i>)	Infestanti sensibili
Euforbia (<i>Euphorbia spp.</i>)	Infestanti sensibili
Falso panico (<i>Setaria spp.</i>)	Infestanti sensibili
Fienarola (<i>Poa annua</i>)	Infestanti sensibili
Fumaria (<i>Fumaria officinalis</i>)	Infestanti sensibili
Giavone americano (<i>Panicum dichotomiflorum</i>)	Infestanti mediamente sensibili
Mercorella comune (<i>Mercurialis annua</i>)	Infestanti sensibili
Papavero comune (<i>Papaver rhoeas</i>)	Infestanti sensibili
Poligonacee (<i>Polygonum spp.</i>)	Infestanti sensibili
Poligono convolvolo (<i>Fallopia convolvulus</i>)	Infestanti sensibili
Sanguinella (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	Infestanti sensibili
Scagliola (<i>Phalaris spp.</i>)	Infestanti sensibili

