

Caratteristiche

	Registrazione	Composizione	CLASSIFICAZIONE		Formu- lazione
			DPD	CLP	
Belem Protezione	N. 15371 del 18-05-2012	Cipermetrina 0,8 g	N	ATTENZIONE H410, EUH401	GR
Kaimo sorbie	N. 15052 del 28-10-2011	Lambda-cialotrina 5%	Xn, N	ATTENZIONE H302, H410, EUH401, H320	EG
Poleci	N. 14898 del 01-08-2011	Deltametrina 25 g/l	Xn, N	PERICOLO H226, H302, H304, H318, H332, H335, H336, H400, H410, EUH006, EUH401	EC
Rotiofen Quick	N. 13720 del 16-05-2007	Clorpirifos puro 250 g/l Deltametrina pura 6 g/l	N	ATTENZIONE H317, H410, EUH401	CS

Banvel S	N°: 13153 del 28-08-2006	Dicamba puro 243,8 g/l	—	ATTENZIONE H315, H319, EUH401	SL
Cetus 360 CS	N. 16498 del 14-12-2015	Clomazone puro 360 g/l	—	H413, EUH208, EUH210, EUH401	CS
Fenotrix 300 SC	N. 16416 del 21-10-2015	Sulcotrione puro 300 g/l	—	ATTENZIONE H317, H361d, H373, H411, EUH401	SC
Ikanos	N. 13106 del 29-12-2010	Nicosulfuron puro 40 g/l	Xi, N	ATTENZIONE H317, H410, EUH401	OD
Penthium EC	N. 12212 del 30-06-2005	Pendimetalin 330 g/l	Xi, N	PERICOLO H304, H315, H319, H410, EUH208, EUH401	EC
Successor 600	N. 12840 del 07-08-2008	Pethoxamide puro 600 g/l	Xn, N	PERICOLO H302, H315, H317, H318, H410, EUH401	EC
Successor T	N. 12841 del 10-07-2008	Pethoxamide 300 g/l Terbutilazina 250 g/l	Xn, N	PERICOLO H301, H319, H410, EUH066, EUH208, EUH401	SE

Barvel S è un marchio registrato Syngenta
Belem Protezione è un marchio registrato SBM Développement
Fenotrix 300 SC è un marchio registrato Sumitomo Chemical Italia Srl
Ikanos, Kaimo Sorbie e Poleci sono marchi registrati Nufarm Italia Srl
Rotiofen Quick e Penthium EC sono marchi registrati ADAMA Italia Srl
Successor 600 e Successor T sono marchi registrati Cheminova A/S

CS - Sospensione di microcapsule
EC - Emulsione concentrata
EG - Granuli emulsionabili idrodispersibili
GR - Granulare (tipo insett. terreno)
SC - Sospensione concentrata
SE - Suspoemulsione
SL - Liquido (concentrato) solubile in acqua
OD - Dispersione oleosa

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale
e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.).

www.siapa.mi.it

Siapa

Alle radici del futuro

DIFESA

MAIS

Siapa

BELEM®
PROTEZIONE

Insetticida microgranulare ad alta densità
contro gli insetti del terreno, su mais,
mais dolce, sorgo e girasole

Dose impiego: 12 kg/ha

Formulazione

BELEM è formulato negli stabilimenti SBM, leader europeo per questo genere di prodotti.

- Microgranulo ad alta densità (p.s. 1,4 g/cm³)
- Nessuna polvere, nessuna deriva
- Elevato numero di grani/cm³
- **Effetto «MESH NET»**
Effetto rete a maglia stretta.
Si crea una rete di protezione tutto intorno al seme e alle radici per una protezione diffusa e prolungata.

Geoinsetticida

Le qualità di Belem

- Efficace sui più importanti insetti terricoli
- Azione di contatto ed ingestione
- Effetto repellente
- Registrato su più colture
- Nessun problema con gli erbicidi normalmente utilizzati
- Inserito nei DPI mais dolce
- Non dilavabile, bassissima solubilità
- Ottima persistenza
- Formulazione ad alta densità (1,4 g/cm³)
- Assenza di polveri e di deriva
- Grande scorrevolezza
- Nessun problema di stoccaggio grazie alla classificazione
- Pratico kit di distribuzione per ottimizzare l'attività

La distribuzione a banda larga con il diffusore a «coda di carpa»

BELEM è un prodotto a base di **cipermetrina**, principio attivo appartenente alla famiglia dei piretroidi.
Questo prodotto possiede una spiccata attività di contatto contro i principali insetti fitofagi del terreno, non è solubile in acqua e non possiede attività sistemica.
Questo significa che **il formulato agisce creando una protezione tutto intorno al seme e alla giovane piantina** e questa protezione è tanto più efficace quanto più è completa ed estesa l'area trattata con BELEM.

SEMINA TRADIZIONALE

SEMINA A BANDA LARGA

SBM ha studiato per questo scopo un diffusore specifico per BELEM.
Questo diffusore, detto a «coda di carpa», da applicare sulle diverse seminatrici, permette una distribuzione allargata del prodotto lungo il solco di semina, creando così una zona di protezione intorno al seme molto più performante rispetto alle tradizionali distribuzioni.

PRE emergenza

Successor^T

La miscela pronta, la soluzione sicura, la scelta ottimale

Pethoxamide: nuova molecola ad attività erbicida di pre-emergenza su graminacee e dicotiledoni

Pethoxamide e terbutilazina: un abbinamento ideale per il controllo delle infestanti nel mais

Impiego in pre-emergenza e post precoce

Dose impiego: 2 – 3 l/ha

a seconda delle tipologie di terreno e a seconda delle diverse esigenze di impiego.

La dose più bassa nel caso di impiego su terreni sciolti - sabbiosi, o ricchi di scheletro e poveri di sostanza organica, e in miscela con prodotti ad azione complementare (isoxaflutolo, sulcotrione, pendimetalin) su infestanti specifiche (*Abutilon*, infestanti triazino resistenti).

La dose più alta su terreni argillosi e in presenza di forti infestazioni di *Solanum nigrum*, *Sorghum halepense*, o *Echinochloa crus-galli*.

Successor⁶⁰⁰

Il formulato a base di pethoxamide (600 g/l) per gli impieghi senza terbutilazina. Registrato anche su soia.

Dose impiego: 1 – 1,5 l/ha

Linee di intervento

Pressione medio-bassa *Abutilon*

SUCCESSOR T + PENTHIUM EC / CETUS 360 CS

Pressione medio-alta *Abutilon*

SUCCESSOR T + FENOTRIX 300 SC

SUCCESSOR 600 + FENOTRIX 300 SC

POST emergenza

IKANOS[®]

Graminicida di post emergenza del mais a base di nicosulfuron

Infestanti controllate: Sorghetta da seme e da rizoma (*Sorghum halepense*), Giavoni (*Echinochloa crus-galli*), Setaria (*Setaria* sp.), Digitaria (*Digitaria sanguinalis*), Gramignone (*Agropyron repens*), Avena (*Avena* sp.), Loietto (*Lolium italicum*), Amaranto (*Amaran-*

thus sp.), Ambrosia (*Ambrosia artemisifolia*), Mercurella (*Mercurialis annua*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Polygonacee (*Polygonum* sp.), Nappola (*Xanthium italicum*)

Dose impiego: 1 – 1,5 l/ha

La base per una ottimale strategia di difesa in post emergenza:

- **Attività su tutte le principali infestanti graminacee e parecchie dicotiledoni**
- **Etichetta autorizzata con la dose massima di p.a. per ettaro**
- **Utilizzabile in miscela con FENOTRIX 300 SC e BANVEL S per completare lo spettro d'azione**

Infestazione mista gram - dicot

IKANOS



FENOTRIX 300 SC



BANVEL S

SUCCESSOR T

SUCCESSOR 600

PENTHIUM EC

FENOTRIX 300 SC

CETUS 360 CS

GEOINSETTICIDI

BELEM PROTEZIONE

INSETTICIDI FOGLIARI (Nottue, Afidi, Piralide, Diabrotica)

KAIMO SORBIE

ROTIOFEN QUICK

POLECI

Formulazione in granuli emulsionabili idrodispersibili per la velocità di un EC e la praticità di un WG
L'abbinamento di due principi attivi per una protezione completa

La deltametrina classica ed efficace

FENOTRIX[®] 300SC

Pre e post emergenza

Erbicida che si caratterizza per l'efficacia e l'estrema flessibilità di impiego. Il prodotto a base di Sulcotrione si presta ad essere utilizzato su mais in pre-emergenza in miscela a prodotti ad ampio spettro d'azione (Successor T) per completarne l'efficacia verso le più difficili infestanti come *Abutilon* e *Xanthium*.

Nelle applicazione di post-emergenza rappresenta invece la base per il controllo delle infestanti a foglia larga (*Abutilon*, *Chenopodio*, *Bidens*, *Polygono*, *Xanthium*, ecc.) in miscela con un graminicida (Ikanos) ed eventualmente a dose ridotta di dicamba (Banvel S) nel caso di presenza di infestanti perenni (*Cirsium*, *Convolvolo*, ecc.).

Attività collaterale nei confronti di *Digitaria*, *Giavone* e *Panicum* nei primi stadi di sviluppo.

Dose impiego: 1 – 1,5 l/ha

La dose minore in miscela con altri partner erbicidi.

La dose maggiore è indicata se il prodotto è utilizzato da solo per il controllo di malerbe più sviluppate (dicotiledoni oltre la quarta foglia) o quando vi sia presenza di graminacee (2-4 foglie).

BANVEL^S

Post-emergenza

Il prodotto a base di dicamba, ideale completamento verso tutte le infestanti dicotiledoni, specie perennanti (*Convolvolo*, *Fallopia*, *Xanthium*, *Acalypha*, ecc).

Dose impiego: 0,8 – 1,2 l/ha

Cetus[®] 360 CS

Pre-emergenza

Erbicida a base di clomazone 360 g/l ad azione residuale utilizzato per applicazioni di pre e post-emergenza delle colture. Il suo principio attivo, Clomazone, appartiene alla famiglia degli ossazolidinoni ed esplica la sua attività inibendo la sintesi della clorofilla e dei carotenoidi delle piante. È assorbito attraverso le radici e gli epicotili, traslocato per via sistemica nello xilema e diffuso alle foglie in senso acropeto. Controlla un ampio numero di infestanti sia mono che dicotiledoni.

Dose impiego: 0,25 – 0,3 l/ha