BORDO ISAGRO® WG

Anticrittogamico rameico in granuli idrodispersibili

Bordo Isagro® WG è un fungicida in granuli idrodisperdibili a base di solfato di rame neutralizzato con calce spenta (poltiglia bordolese).
È efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree.

Vantaggi

Formulazione innovativa "Fluid Bed Technology". Ampio spettro d'azione. Impiegabile anche in agricoltura biologica.

Compatibilità

Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri etc.) e con quelli contenenti Thiram.

Fitotossicità

Non trattare durante la fioritura.
Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi effettuare piccoli saggi preliminari o consultare il personale tecnico.

Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (g/hl)	Note	Periodo carenza
Vite	Peronospora, Marciume nero, Melanosi. Azione collaterale su: Escoriosi, Rossore parassitario	500-1000	In funzione delle condizioni climatiche (pioggia, temperatura, bagnature), dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.	20 gg.
Agrumi	Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Allupatura, Marciume o gommosi del colletto, Fumaggine. Azione collaterale su: Batteriosi.	650-1000	Intervenire mensilmente a partire dalla fine di gennaio.	20 gg.
Melo	Ticchiolatura	500-830	Intervenire prima della fioritura, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche (piogge, bagnature, temperature), dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.	Trattamenti fino a inizio fioritura
	Monilia, Cancro delle pomacee	830	Intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme.	
	Marciume del colletto	650-830	Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.	
Pero	Ticchiolatura, Septoriosi	500-830	Intervenire prima della fioritura, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche (piogge, bagnature, temperature), dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.	Trattamenti fino a inizio fioritura
	Marciume del colletto	650-830	Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.	
	Colpo di Fuoco batterico	500-830	Trattamenti primaverili e invernali.	
Pero, Cotogno	Monilia, Cancro delle pomacee	830	Intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme.	Trattamenti fino a inizio fioritura
Albicocco	Corineo, Monilia	1300-2000	Trattamenti invernali.	Solo trattamenti invernali
Ciliegio	Monilia, Bolla	1300-2000	Trattamenti invernali.	Solo trattamenti invernali
	Marciume del colletto	650-1000	Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.	



Composizione

Rame metallo **20%**
(da solfato neutralizzato con calce spenta)

Formulazione

Granuli idrodispersibili

Confezioni

10 - 20 kg

Registrazione

n° 13908 del 17.08.2007

ATTENZIONE

Bordo Isagro® WG:
marchio registrato e prodotto originale Isagro Spa.

Colture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Note	Periodo carenza
Pesco, Nettarine e Percoche	Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla	1300-2000		Trattamenti invernali.	Solo trattamenti invernali
Susino	Corineo, Monilia, Maculatura Batterica	1300-2000		Trattamenti invernali.	Solo trattamenti invernali
Albicocco, Ciliegio, Susino, Pesco, Nettarine e Percoche	Cancro batterico	500-1000		Intervenire alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.	Solo trattamenti invernali
Mandorlo	Corineo, Monilia	1300-2000		Trattamenti invernali.	20 gg.
	Cancro batterico	500-1000		Alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.	
Fragola	Vaiolatura, Marciume del colletto	450-500		Intervenire alla ripresa vegetativa.	3 gg.
Olivo	Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio o occhio di pavone	500-1000		Intervenire nelle epoche di maggior rischio infettivo (autunno, primavera).	20 gg.
Actinidia	Marciume del colletto	650-1000		Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.	20 gg.
	Batteriosi (*Pseudomonas viridiflava*)	1000-1200		Intervenire in autunno alla caduta delle foglie ed in primavera alla schiusura delle gemme.	
Fruttiferi a guscio (nocciolo, castagno, mandorlo, noce, pino da pinoli e pistacchio) e Fruttiferi vari	Cancri rameali, Batteriosi	1000		Trattamenti autunno-invernali.	20 gg.
		500-800		Trattamenti primaverili-estivi.	
Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno	Peronospora. Azione collaterale su: Muffa grigia, Marciumi batterici	450-650		Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.	3 gg.
Pomodoro	Cladosporiosi, Peronospora, Marciume zonato, Septoriosi, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi	450-650		Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.	3 gg.
Melanzana	Moria delle piantine, Vaiolatura dei frutti. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi	450-650		Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.	3 gg.
Melone*, Cocomero*, Zucca*, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino	Maculatura angolare, Peronospora. Azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico	450-650	* Max 4,4	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.	3 gg.
Cavoli	Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella, Peronospora. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi	450-650		Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.	20 gg.
Asparago	Ruggine. Azione collaterale su: Muffa grigia	450-650		Limitare i trattamenti a subito dopo la raccolta dei turioni.	-
Carciofo, Cardo	Peronospora della lattuga. Azione collaterale su Marciume molle batterico	450-650		Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.	20 gg.
Finocchio, Sedano, Prezzemolo	Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano. Azione collaterale su: Marciume molle batterico	450-650		Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.	20 gg.
Ortaggi a foglia ed erbe fresche, Legumi	Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi	450-650		Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.	20 gg.
Oleaginose	Peronospora, Antracnosi	-	5-8	Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie.	20 gg.
Patata	Peronospora, Alternariosi delle solanacee	-	5	Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.	7 gg.
Barbabietola da zucchero	Cercospora, Peronospora, Ruggine	-	5-5,5	Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.	20 gg.
Tabacco	Peronospora, Batteriosi, Antracnosi	-	5-8	Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.	20 gg.
Floreali, Ornamentali	Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi	500-1000		Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.	-
Cipresso	Cancro del cipresso	1300-2500		Intervenire quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetere secondo necessità.	-