Sarmox® 440 WG

Fungicida ad azione translaminare e di contatto per la difesa della vite e di altre colture orticole e industriali

Sarmox® 440 WG è un fungicida in granuli idrodispersibili ad azione translaminare endoterapica e di contatto, efficace contro la Peronospora e altre crittogame. La particolare formulazione in granuli idrodispersibili garantisce la massima semplicità d'uso e sicurezza per l'operatore, in quanto il prodotto non produce polvere durante le operazioni di preparazione della soluzione antiparassitaria.

Vantaggi
Attività preventiva e curativa. Elevata prontezza di azione.

Compatibilità
È compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida; è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina.

Avvertenze
Trattare nelle ore più fresche della giornata.

Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (g/hl)	Note	Periodo carenza
Vite	Peronospora. Azione collaterale nei confronti di Muffa grigia ed Escoriosi.	200 - 300	Iniziare gli interventi quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni e proseguire gli interventi a cadenza di 8-10 giorni in modo preventivo o al massimo entro 48 ore da una bagnatura o una pioggia infettante. In presenza di una forte pressione della malattia, ridurre gli intervalli tra i trattamenti a 6-8 giorni.	20 gg.
Pomodoro	Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Septoria. Azione collaterale contro Batteriosi.	200 - 300	Iniziare gli interventi quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni e proseguire gli interventi a cadenza di 8-10 giorni. In presenza di una forte pressione delle malattie e/o di rapido accrescimento della vegetazione, ridurre gli intervalli tra i trattamenti a 6-8 giorni.	3 gg.
Patata, Tabacco				20 gg.
Colture Orticole: Lattuga, Indivia, Spinacio, Melone, Cetriolo, Zucchino, Pisello, Aglio, Cipolla, Porro	Peronospora, Antracnosi, Alternaria, Cercospora, Septoria. Azione collaterale contro Batteriosi.	200 - 300	Iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle malattie e proseguire ad intervalli di 6-10 giorni. In caso di sintomi in atto si consiglia di eseguire 2 interventi ravvicinati, distanziati di 4-5 giorni l'uno dall'altro.	20 gg.
Carciofo				21 gg.
Girasole, Soia	Peronospora, Alternaria, Septoria. Azione collaterale contro Sclerotinia.	200 - 300		28 gg.
Rosa	Peronospora. Azione collaterale contro Ticchiolatura e Ruggine.	200 - 300	Iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia e proseguire ad intervalli di 6-10 giorni. In caso di sintomi in atto si consiglia di eseguire 2 interventi ravvicinati, distanziati di 4-5 giorni l'uno dall'altro.	-



Composizione
Cimoxanil **4%**
Rame metallo **40%**
(da Ossicloruro)

Formulazione
Microgranuli idrodispersibili

Confezioni
1 - 5 kg

Registrazione
n° 14163 del 14.12.2011



Sarmox®:
marchio registrato Gowan Italia.
Prodotto originale Sapec Agro.