





## FUNGICIDA TRANSLAMINARE E SISTEMICO PER IL CONTROLLO DELLA PERONOSPORA DELLA VITE

A base dell'isomero attivo Metalaxil-M e di Folpet, RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE ha una spiccata efficacia nei confronti della Peronospora. Il rapido assorbimento e la spiccata sistemía di Metalaxil-M garantiscono una protezione pronta e prolungata sia della vegetazione presente al momento del trattamento, sia di quella di nuova formazione. La formulazione PEPITE, esclusiva di Syngenta, conferisce al prodotto notevoli vantaggi in termini di sicurezza e praticità d'uso, nelle fasi di manipolazione, di stoccaggio e di applicazione.

In viticoltura, per una protezione ottimale dalla Peronospora durante tutto il ciclo colturale e per una corretta gestione delle resistenze, utilizzare RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE in alternanza a PERGADO, in modo da sfruttare le caratteristiche complementari e sinergiche dei due fungicidi.

# **FUNGICIDA**

# **COMPOSIZIONE**

Metalaxil-M 4,85% Folpet 40%

### **FORMULAZIONE**

granuli idrodisperdibili

#### **NUMERO DI REGISTRAZIONE**

12878 del 3.1.06

## **INDICAZIONI DI PERICOLO (CLP)** ATTENZIONE







## DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	<b>Dosi</b> (g/hl)	<b>Dosi</b> (kg/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite: uva da vino	Peronospora	200	2	Intervenire al verificarsi di condizioni sufficienti a promuovere l'infezione primaria. Proseguire i trattamenti ogni 7-14 giorni, in funzione della pressione della malattia.	28 gg

## **ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:** Effettuare al massimo 3 applicazioni.

Per un controllo contemporaneo dell'Oidio miscelare con TOPAS 10 EC, TOPAS COMBI Liquido, TOPAS 200 EW, SCORE 25 EC, CIDELY, DYNALI.



## **CONFEZIONI**

scatole da 1 kg in cartoni da 10 pezzi

scatole da 5 kg in cartoni da 4 pezzi

