



# KOHINOR® OLEA



Avvertenza: **ATTENZIONE**  
Indicazioni di pericolo:  
**H410 - EUH401**

**FORMULAZIONE:**  
Concentrato solubile

**COMPOSIZIONE:**  
Imidacloprid puro 17,1% (200 g/l)

**IRAC:**  
4A

**N. REGISTRAZIONE:**  
14921 del 16-12-2011

- Insetticida sistemico autorizzato per il controllo della Mosca dell'Olivo con importante azione collaterale verso gli altri fitofagi.
- Elevata sistemica acropeta che permette al prodotto di raggiungere gli apici in accrescimento allungandone la durata d'azione e rendendolo adatto ai trattamenti precoci.
- Il limite della fioritura legato ad alcune colture non si applica nel caso di trattamento in serra ove autorizzato.
- Elevata persistenza d'azione.

COLTURA	FITOFAGO	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Olivo	Mosca dell'Olivo	50 - 75 ml/hl (max 0,75 l/ha)		28 giorni
Melo	Afidi, Cicaline, Microlepidotteri, Psilla del Melo, Tentredine del Pero ed Eriosoma	50 ml/hl (max 0,75 l/ha)		28 giorni
Pero				50 giorni
Albicocco	Afidi, Cicaline, Microlepidotteri, Tentredine del susino, Metcalfa, Camicetta del Mandorlo	50 ml/hl (max 0,75 l/ha)		35 giorni
Mandorlo				14 giorni
Pesco, Susino, Ciliegio, Nettareo				21 giorni
Arancio, Clementino, Mandarino, Limone	Afidi Aleurodidi, Minatrice serpentina delle foglie	50 ml/hl (max 0,75 l/ha) 75 ml/hl (max 0,75 l/ha)		14 giorni
Pomodoro, Melanzana, Peperone	Afidi Aleurodidi, Dorifora	50 ml/hl (max 0,50 l/ha) 75 ml/hl (max 0,75 l/ha)		7 giorni
Melone. Anche in serra: Zucchini, Cetriolo, Cocomero	Afidi Aleurodidi	50 ml/hl (max 0,50 l/ha) 75 ml/hl (max 0,75 l/ha)	Massimo 1 trattamento/anno	vedi etichetta
Patata	Afidi Dorifora	50 ml/hl (max 0,50 l/ha) 75 ml/hl (max 0,75 l/ha)	Per Olivo, Pomacee, Drupacee, Agrumi, Vite, Zucchini, Cetriolo, Cocomero, Fagiolo, Fagiolino, Fragola, Erba medica, Floreali e Ornamentali il trattamento è consentito solo in post-fioritura	14 giorni
Lattughe, Scarola, Dolcetta, Crescione, Rucola, Senape Nera, Barbarea, foglie e germogli di Brassica spp., Indivia, Cicoria e Radicchio	Afidi	50 ml/hl (max 0,50 l/ha)	Su Solanacee, Cucurbitacee e Tabacco è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75 - 1 l/ha di prodotto Per erba medica: trattare subito dopo lo sfalcio e non applicare su colture per la produzione di seme	3 giorni, (Scarola 14 giorni)
Fagiolo e Fagiolino	Afidi	50 ml/hl (max 0,50 l/ha)		3 giorni
Cavolfiore, Broccolo	Afidi	50 ml/hl (max 0,50 l/ha)		14 giorni
Carciofo	Afidi	50 ml/hl (max 0,50 l/ha)		3 giorni
Anche in serra: Fragola	Afidi e Aurodidi	0,75 l/ha tratt. per irrigazione		30 giorni
Erba medica	Afidi	50 ml/hl (max 0,50 l/ha)		14 giorni
Vite in vivaio	Cicaline, Metcalfa, Fillossera	50 ml/hl (max 0,50 l/ha)		14 giorni
Tabacco	Afidi, Altica	50 ml/hl (max 0,50 l/ha)		14 giorni
Anche in serra: Floreali e Ornamentali	Afidi, Metcalfa Aleurodidi	50 ml/hl (max 0,50 l/ha) 75 ml/hl (max 0,75 l/ha)		-

### MISURE DI MITIGAZIONE

Per proteggere le api: il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per le api. Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori, sfalcare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione comprendendo possibilmente anche le immediate vicinanze della coltura.

Per proteggere gli organismi acquatici: fascia di rispetto non trattata di 20 m dai corpi idrici superficiali su Olivo.