

Zammo®

ERBICIDA SELETTIVO PER LATTUGHE, INSALATE E COLZA

Zammo® è un erbicida selettivo che agisce prevalentemente per assorbimento radicale, efficace contro infestanti graminacee e dicotiledoni di lattughe, insalate e colza.

Composizione

PROPIZAMIDE g 36 (400 g/l)

Formulazione

Sospensione concentrata

Registrazione 15236 del 22/02/2013

Classificazione CLP

ATTENZIONE



H351



H411

Confezioni



12x1

Campi d'applicazione, dosi e modalità d'impiego

COLTURA	INFESTANTI SENSIBILI	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Lattughe e altre insalate escluse le baby leaf e le brassicacee raccolte fino allo stadio di ottava foglia vera. (Dolcetta, Lattuga cappuccina, Lattuga iceberg, Lattuga romana, Scarola, Cicoria selvatica, Cicoria a foglia rossa, Radicchio, Indivia riccia, Cicoria pan di zucchero, Dente di leone, Valerianella) e BRASSICACEE	Coda di volpe (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Avena (<i>Avena spp.</i>) Forasacco (<i>Bromus spp.</i>) Sanguinella (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Loietto (<i>Lolium spp.</i>) Fienarola (<i>Poa spp.</i>) Setaria (<i>Setaria spp.</i>) Farinello (<i>Chenopodium album</i>) Cuscuta (<i>Cuscuta spp.</i>) Centocchio (<i>Stellaria media</i>) Papavero (<i>Papaver roheas</i>) Plantaggine (<i>Plantago spp.</i>) Correggiola (<i>Polygonum aviculare</i>) Persicaria (<i>Polygonum persicaria</i>) Erba porcellana (<i>Portulaca oleracea</i>) Erba morella (<i>Solanum nigrum</i>) Romice (<i>Rumex spp.</i>) Veronica (<i>Veronica spp.</i>)	1,75-3,75 l/ha	Pre semina, pre trapianto o post semina o post trapianto	Colza: 180 giorni Altre: 30 giorni
Colza	Infestanti mediamente sensibili: Amaranto comune (<i>Amaranthus spp.</i>) Borsa del pastore (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Giavone (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Persicaria maggiore (<i>Polygonum lapathifolium</i>)	1-1,75 l/ha	Post-emergenza della coltura, dallo stadio di 2-3 fogli vere	

Consigli d'impiego

Su lattughe e insalate impiegare in pre semina o pre trapianto, prima dell'emergenza delle infestanti, provvedendo ad un leggero interramento dopo l'applicazione.

Zammo® può essere impiegato anche in post semina, entro 15 giorni dalla stessa, o in post trapianto, con la coltura non oltre lo stadio di 4-6 foglie.

Su colza impiegare in post emergenza, dallo stadio di 2-3 foglie vere.

Impiegare volumi di acqua tra 300 e 500 l/ha per assicurare una completa bagnatura del terreno.

Compatibilità

Il prodotto si impiega da solo.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta. È necessario rispettare gli intervalli sottoindicati tra l'applicazione di Zammo® e la successiva semina o trapianto di alcune colture:

2 mesi per mais, sorgo, fragola, patata dolce, crucifere; 4 mesi per melanzana, pomodoro, peperone, patata, spinacio, aglio, cipolla, barbabietola da zucchero, menta; 6 mesi per frumento, orzo, segale, avena, triticale e graminacee foraggere. Prima dell'impianto di queste colture effettuare una lavorazione profonda del terreno.

