

Support 100 EC

FUNGICIDA SISTEMICO PER VITE, FRUTTIFERI E ORTICOLE

Support 100 EC è un fungicida sistemico triazolico ad ampio spettro di azione.
Può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante.

Composizione

PENCONAZOLO puro g 10,15 (100 g/l)

Formulazione

Concentrato emulsionabile

Registrazione N. 16297 del 04/03/2015

Classificazione CLP

ATTENZIONE



H319 H410 H361d

Confezioni



12x1

Campi d'applicazione, dosi e modalità d'impiego

COLTURA	SPECIE PARASSITA	Dosi	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite	Oidio (<i>Erysiphe necator</i>)	25-30 ml/hl	Applicazioni preventive ad intervalli di 14-16 giorni	14 giorni
		50 ml/hl (Max 0,5 l/ha)	Applicazioni curative a cadenza di 5-7 giorni	
Melo	Ticchiolatura (<i>Venturia spp.</i>) Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	30-40 ml/hl (Max 0,675 l/ha)	Trattamenti preventivi ogni 10-12 giorni. Per interventi curativi (in presenza di sintomi) applicare la dose di 40-45 ml/hl ogni 5 - 7 giorni	
	Monilia (<i>Monilia fructigena</i>) Marciume verde azzurro (<i>Penicillium spp.</i>)	40-45 ml/hl	2-3 trattamenti in pre raccolta a cadenza settimanale	
Pero	Ticchiolatura (<i>Venturia spp.</i>)	25-35 ml/hl preventivi 30-40 ml/hl curativi (Max 0,6 l/ha)		
Pesco	Oidio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	40-50 ml/hl (Max 0,75 l/ha)	Dalle fasi di caduta petali a cadenza di 10-14 giorni Contro Monilia in pre raccolta	
	Monilia (<i>Monilia spp.</i>) Marciume verde azzurro (<i>Penicillium spp.</i>)	50 ml/hl (Max 0,75 l/ha)	2-3 trattamenti a cadenza settimanale	
Tabacco	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	35-50 ml/hl (Max 0,5 l/ha)	2-4 applicazioni preventive a intervallo di 10-14 giorni	

COLTURA	SPECIE PARASSITA	Dosi	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Melone, Zucca, Zucchini, Cetriolo, Peperone, Pomodoro, Fragola, Cocomero (pieno campo e serra)	Oidio (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>) Oidio (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Leveillula spp.</i>)	25-50 ml/hl (Max 0,5 l/ha)	2-4 applicazioni a carattere preventivo ad intervalli di 14-16 giorni	14 giorni
Pisello, Carciofo (pieno campo)	Oidio (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Leveillula spp.</i>)	25-50 ml/hl (Max 0,5 l/ha)		
Ribes a Grappolo (pieno campo)	Oidio (<i>Sphaerotheca spp.</i>)	50 ml/hl (Max 0,5 l/ha)	3 applicazioni a partire da ingrossamento dei bottoni fiorali a intervalli di 10-14 giorni	
Floreali ed ornamentali	Oidio (<i>Erysiphe spp.</i>) Ruggini (<i>Puccinia spp.</i>)	25-50 ml/hl	Ogni 10-14 giorni	

Consigli d'impiego

In generale applicare Support 100 EC preventivamente alle dosi riportate in etichetta. Contro la ticchiolatura del melo e del pero aggiungere un prodotto di copertura.

Su fragola eseguire al massimo 1 intervento all'anno. Su pomodoro e peperone eseguire al massimo 2 interventi all'anno.

Avvertenze

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

