

# Vival 450 SL

**NEW**

Erbicida fogliare sistemico  
di post emergenza delle infestanti

La formulazione  
di **Vival 450 SL**  
non contiene ammina  
di sego polietossilata.



ETICHETTA

<b>Composizione</b>	Glifosate 450 g/l (*)
<b>Formulazione</b>	Sospensione liquida (SL)
<b>Classificazione CLP</b>	
<b>Registrazione</b>	n. 15367 del 31/03/2016
<b>Confezione</b>	1L  15L

**VIVAL 450 SL** è un erbicida fogliare sistemico di post emergenza delle infestanti, efficace sulla maggior parte delle monocotiledoni e dicotiledoni annuali e perenni. Vival 450 SL viene assorbito dalle foglie e trasportato sistemicamente a tutti gli organi della pianta, accumulandosi specialmente nelle radici e negli organi sotterranei delle piante perenni. I sintomi (arresto dello sviluppo, clorosi e necrosi) appaiono una o due settimane dopo l'applicazione, il completo controllo delle malerbe lo si ottiene dopo circa un mese.

Trattamento per coltura			
COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	DOSE	TEMPO di CARENZA
<b>AGRUMI</b> <b>DRUPACEE</b> <b>POMACEE</b> <b>OLIVO</b> <b>VITE</b> <b>NOCE</b> <b>NOCCIOLO</b> <b>PISTACCHIO</b>	Vival 450 SL controlla la grande maggioranza delle infestanti graminacee e dicotiledoni annuali, biennali e perenni. Consulta l'etichetta per l'elenco completo.	2,4 - 4,8 l/ha (infestanti annuali e biennali)	21 gg olivo  28 gg pomacee
<b>LETTI DI SEMINA</b> <b>(Cereali autunno-vernini e cereali primaverili-estivi)</b>		3,2 - 4,8 l/ha (infestanti annuali e biennali)  4 - 5,6 l/ha (infestanti poliennali o perenni)	-

#### AVVERTENZE AGRONOMICHE

Vival 450 SL va applicato su malerbe emerse, dai primi stadi di sviluppo anche fino alla piena maturazione. La diluizione ottimale la si ottiene con volumi d'acqua compresi tra uno e quattro ettolitri, adattando il volume irrorato al livello di sviluppo delle malerbe.

