Kelly R DF


Indicazioni di pericolo CLP



PERICOLO

Frasi H
H318, H410, EUH401

Confezioni
1 kg - 10 kg



Gruppo FRAC	Marchio registrato	Titolare registrazione
33 / M1	Isagro Spa	Helm AG
Gruppo imballaggio	**Trasporto ONU**	**Classificazione ADR**
III	3077	9

Fungicida per la difesa di vite, agrumi, orticole, ornamentali

Caratteristiche: Il prodotto è un'associazione di due principi attivi dalle caratteristiche complementari. Il rame è dotato di azione di copertura e resistenza al dilavamento, il Fosetil alluminio è dotato di sistemia ascendente e discendente e di lunga persistenza d'azione. Kelly R DF è particolarmente efficace nei confronti delle Peronosporacee e, data la presenza del rame, alle dosi sottoindicate presenta una efficacia battericida collaterale. La formulazione in granuli idrodisperdibili ne rende l'impiego comodo e sicuro per l'operatore.

Composizione: **Fosetil Alluminio** 25 g - **Rame metallo** (da ossicloruro tetraramico) 25 g

Miscibilità: Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina (polisolfuri, etc.), quelli contenenti Thiram, gli oli e con i concimi fogliari azotati.

Registrazione: N° 12714 del 28-11-2008

Formulazione: WG - Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)

Colture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo (20 giorni)	Antracnosi *(Colletotrichum gloeosporioides)*, Mal secco degli agrumi *(Deuterophoma tracheiphila)*, Allupatura *(Phytophthora citrophthora)*, Marciume o gommosi del colletto *(Phytophthora citrophthora, P. parasitica)*	500 g/hl	Irrorazioni fogliari in primavera ed in autunno.
Fragola (30 giorni)	Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*	150-320 g/hl	Intervenire con irrorazioni fogliari effettuando un trattamento in autunno e due in primavera.
Vite (40 giorni)	Peronospora della vite *(Plasmopara viticola)*	250-400 g/hl (pari a 2,5-4 kg/ha)	Irrorazioni fogliari preventive ogni 8-12 giorni. Adottare la dose più alta e gli intervalli più brevi quando le condizioni climatiche ed infettive favoriscono la malattia.
Pero	Maculatura bruna	200 g/hl	**Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.**
		100 g/hl	Alla caduta delle foglie e al rigonfiamento delle gemme. **Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.**
Pomodoro (15 giorni)	Alternariosi delle solanacee *(Alternaria solani)*, Peronospora del pomodoro *(Phytophthora infestans)*, Septoria del pomodoro *(Septoria lycopersici)*, azione collaterale su Batteriosi *(Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestris)*	4-5 kg/ha	Intervenire ogni 8-12 giorni.
Cocomero, Melone (15 giorni)	Peronospora delle cucurbitacee *(Pseudoperonospora cubensis)*	5 kg/ha	Intervenire ogni 8-12 giorni.
Spinacio (15 giorni)	Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi	3-5 kg/ha	Intervenire nei periodi di maggior rischio infettivo.
Carciofo (15 giorni)	Peronospora della lattuga *(Bremia lactucae)*	4-6 kg/ha	Intervenire ogni 8-12 giorni.
Ornamentali	*Peronospora* sp., *Bremia* sp. (Peronospore delle ornamentali)	400-600 g/hl	Irrorazioni fogliari preventive.

Indicazioni per il corretto impiego - Non trattare durante la fioritura. Su varietà poco note di colture orticole ed ornamentali od in caso di dubbi è necessario compiere piccoli saggi preliminari prima di estendere il trattamento all'intera superficie.

Gli Agrofarmaci riportati in questo catalogo sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni